

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Detrusitol® Retard, 1,4 og 2,8 mg, hårde depotkapsler indeholder:

4 mg tolterodintartrat svarende til 2,8 mg tolterodin eller 2 mg tolterodintartrat svarende til 1,4 mg tolterodin.

Øvrige indholdsstoffer:

Saccharose, majsstivelse, ethylcellulose, triglycerider, oliesyre, hypromellose, gelatine, shellac, titandioxid (E 171), indigocarmin (E 132), propylenglycol og simeticon.

Yderligere i 1,4 mg:

Jernoxid (E 172).

Pakningsstørrelser:

Detrusitol® Retard fås i:

Detrusitol® Retard 1,4 mg fås i pakninger med 30 hårde depotkapsler.

Detrusitol® Retard 2,8 mg fås i pakninger med 28, 30, 98 og 100 hårde depotkapsler.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Detrusitol® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Health AB.

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN DETRUSITOL® RETARD

Hårde depotkapsler 1,4 mg og 2,8 mg

Tolterodin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Detrusitol® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Detrusitol® Retard og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Detrusitol® Retard.
3. Sådan skal du tage Detrusitol® Retard.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Detrusitol® Retard.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkningen af Detrusitol® Retard og hvad du skal bruge det til

- Detrusitol® Retard afslapper musklerne i blæren og mindsker derved trykket i urinblæren, så blæren bedre kan holde på urinen.
- Du kan tage Detrusitol® Retard, hvis du lider af ufrivillig vandladning (urgeinkontinens), hyppig vandladning eller pludselig vandladningstrang.

Lægen kan have givet dig Detrusitol® Retard til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Detrusitol® Retard

Tag ikke Detrusitol® Retard

- hvis du er overfølsom over for tolterodin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- ikke kan komme af med vandet.
- lider af grøn stær (forhøjet tryk i øjet, snærvinklet glaukom) og ikke bliver behandlet effektivt for det. Tal med lægen.
- lider af myasthenia gravis (sygdom med alvorlig muskelsvaghed).
- lider af colitis ulcerosa i svær grad (blødende

betændelse med sår i tyktarmen).

- har en tyktarmslidelse med svær forstoppelse.


Vær ekstra forsigtig med at tage Detrusitol® Retard

Tal med lægen, inden du tager Detrusitol® Retard, hvis du

- ikke kan tømme blæren, f.eks. pga. forstørret blærehalskirtel (prostata).
- har problemer med fødens passage gennem maven eller tarmen, f.eks. pga. forsnævring af maveporten eller nedsat bevægelse i tarmen.
- har en nyre- eller leversygdom.
- lider af nervebetændelse med smerter og føleforstyrrelser.
- har spiserørsbrok.
- eller nogen i din nærmeste familie har en særlig ændring i hjertekurven (QT-forlængelse) eller du tager quinidin.
- har lavt indhold af kalium, calcium eller magnesium i blodet. Det kan du f.eks. have, hvis du tager vanddrivende medicin eller medicin mod osteoporose.
- har langsom eller uregelmæssig puls, betændelse i hjertemusklen, hjertekrampe, hjerterisikto eller du tager medicin mod uregelmæssig hjerterytme (amiodaron og sotalol).

Brug af anden medicin

- Tal med din læge, hvis du tager:
 - medicin mod infektioner (erythromycin, clarithromycin).
 - medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol, itraconazol).
 - medicin mod HIV-infektion.
 - medicin mod kvalme og opkastninger (metoclopramid, cisaprid).
 - anden medicin, der virker på samme måde som Detrusitol® Retard (anti muskarine



egenskaber), eller medicin der virker modsat af Detrusitol® Retard (kolinerge egenskaber). Spørg lægen, hvis du er usikker.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Detrusitol® Retard, og/eller Detrusitol® Retard kan påvirke virkningen af anden medicin. Det kan ændre virkningen eller give flere bivirkninger. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Detrusitol® Retard sammen med mad og drikke

- Du kan tage Detrusitol® Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
- Du skal tage Detrusitol® Retard depotkapsler med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du må normalt ikke tage Detrusitol® Retard, hvis du er gravid.

Amning:

- Hvis du ammer, må du kun tage Detrusitol® Retard efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Detrusitol® Retard kan give bivirkninger, såsom synsforstyrrelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Detrusitol® Retard

Denne medicin indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Detrusitol® Retard

3. Sådan skal du tage Detrusitol® Retard

Depotkapslerne skal sluges hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 depotkapsel på 2,8 mg én gang dagligt. Hvis du får generende bivirkninger, kan dosis eventuelt nedsættes til 1 kapsel på 1,4 mg én gang dagligt. Tal med lægen.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn:

Børn må normalt ikke få Detrusitol® Retard.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Detrusitol® Retard, hårde depotkapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine hårde depotkapsler til alle de anførte doseringer.

Tag altid Detrusitol® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Detrusitol® Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Detrusitol® Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Symptomerne kan være synsforstyrrelser og vandladningsbesvær.

Ved voldsom overdosering kan endvidere optræde:

- Kramper,
- hallucinationer, ophidselse, pirrelighed,
- problemer med vejtrækningen,
- hurtig puls.

Hvis du har glemt at tage Detrusitol® Retard

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Detrusitol® Retard

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Detrusitol® Retard.

Fortæl det straks til lægen, hvis dine vandladningsproblemer bliver værre, efter behandlingen med Detrusitol® Retard er stoppet.

4. Bivirkninger

Detrusitol® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hjertesvigt med smerter i brystet, åndenød, evt. rallende åndedræt. Ring 112.
- Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden)

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112, da det kan være livsfarligt.
- Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Mundtørhed. Hvis du tager Detrusitol® Retard i mere end 2-3 uger, skal du passe ekstra på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Bihulebetændelse.
- Svimmelhed, hovedpine. Træthed, søvnighed.
- Tørre øjne. Unormalt syn, nedsat evne til at se skarpt.
- Halsbrand, forstoppelse, mavesmerter, øget tarmluft, diaré.
- Smerter og svien ved vandladningen.
- Hævede fødder, ankler og hænder.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Manglende evne til at tømme blæren, evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen, hvis du får besvær med at lade vandet.
- Brystsmerter. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Hjerteranken. Nervøsitet. Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Overfølsomhed.
- Hukommelsessvækkelse.

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden)

- Nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
- Hallucinationer. Kan være alvorlige. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Brændende eller sviende fornemmelse bag brystbenet samt sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre i spiserøret.
- Forvirring.
- Opkastning
- Tør hud, hudrødmen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Sådan opbevarer du Detrusitol® Retard

- Opbevar Detrusitol® Retard utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Detrusitol® Retard ved temperaturer over 30 °C.
- Opbevar Detrusitol® Retard i original ydre emballage.
- Tag ikke Detrusitol® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.