

Vancomycin Axellia

Kapsler, hårde 125 mg, 250 mg

Læs denne information godt igennem, inden du begynder at tage medicinen

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen
- Lægen har ordineret Vancomycin Axellia kapsler til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

1. Virkning og anvendelse

Vancomycin Axellia kapslen 125 mg er lys grå/grå påtrykt Vanco 125 mg.
Vancomycin Axellia kapslen 250 mg er turkis/grøn påtrykt Vanco 250 mg.

Vancomycin er et antibiotikum, som udelukkende virker i selve tarmsystemet.

Du kan bruge Vancomycin Axellia kapsler ved tarmbetændelse, der skyldes bakterien Clostridium difficile.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Vancomycin Axellia kapsler

Tag ikke Vancomycin Axellia kapsler hvis:

- du er overfølsom over for det virksomme indholdsstof eller ét eller flere af de øvrige indholdstoffer.

Særlige forholdsregler

Tal med din læge, hvis du lider af udbredte betændelsessygdomme i tarmene, eller hvis dine nyrer ikke virker normalt. Følg lægens anvisninger.

Brug af Vancomycin Axellia sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Vancomycin Axellia kapsler sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Vancomycin Axellia kapsler efter lægens anvisning.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Vancomycin Axellia, da Vancomycin Axellia udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vancomycin Axellia kapsler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Vancomycin Axellia, og Vancomycin Axellia kan ændre virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.

Hvis du får lægemidler, der kan påvirke hørelsen eller nyrerne, skal du tale med din læge om hyppig kontrol.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller

har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Vancomycin Axellia kapsler

Dosering

Voksne

4 kapsler (à 125 mg) eller 2 kapsler (à 250 mg) 4-6 gange i døgnet.

Børn

50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4-6 doser, dog maksimalt 2 g/døgn.

Eksempel: et barn på 20 kg skal have 1000 mg i døgnet fordelt på 4-6 doser.

Kapslerne skal sluges hele.

Tal med din læge, hvis du har nedsat funktion af nyrerne. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for meget Vancomycin Axellia kapsler?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Vancomycin Axellia kapsler end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Har du glemt at tage Vancomycin Axellia kapsler?

Ved glemt dosering skal den efterfølgende dosis ikke øges. Fortsæt behandlingen som anvist af din læge.

4. Bivirkninger

Vancomycin Axellia kapsler kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)
Svære overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue.
Ring evt. 112.
Nyresvigt og betændelse i nyrerne (feber og blod i urinen). Søg straks læge.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1-10 ud af 10.000 patienter):
Skællende og blæredannende hudsygdomme, rødmen på overkroppen, blæreagtigt udslæt, afskalning af de øverste hudlag. Muskelkrampe, smerter i bryst og ryg. Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder og infektioner. Søg straks læge.
Ring evt. 112.

Darley Leaflets

Wellington Road, Burton-on-Trent, Staffordshire, DE14 2AD.

Telephone: 01283 564936 • Fax 01283 545688 • E-mail mailbox@darleylimited.co.uk

<i>Darley Job No.:</i> 10823	<i>Customer:</i> Encap Drug Delivery	<i>Product:</i> Vancomycin AIPILDK	<i>Customer Ref No.:</i> 21194-24	<i>Product Licence No.:</i> N/A	<i>Size:</i> 297mm x 105mm	<i>Colours:</i> Black – Both Sides	<i>Originated By:</i> Graham
<i>Date Originated:</i> 16/04/2009	<i>Updated By:</i> Graham	<i>Date Updated:</i> 22/04/2009	<i>Spell Checked By:</i> N/A	<i>Operator Check:</i> Graham	<i>2nd Check By:</i> PC	<i>Proof No:</i> 3	<i>Date Proofed:</i> 22/04/2009

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
Hørenedsættelse, kvalme, udslæt, kløe, kulderystelser og feber.

Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
For lavt blodtryk, lejlighedsvis rødmen i ansigtet.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
Øresusen, svimmelhed, nældefeber.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.
Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får alvorlige bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring
Opbevar Vancomycin Axellia kapsler utilgængeligt for børn.
Anvend ikke Vancomycin Axellia kapsler efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information
Aflever altid medicinrester på apoteket.

Vancomycin Axellia indeholder:
Det virksomme indholdsstof i Vancomycin Axellia kapsler er Vancomycin 125 mg eller 250 mg som vancomycinhydrochlorid.
De øvrige indholdsstoffer er: Macrogoler; gelatine; jernoxid, sort (E172); jernoxid, gul (E172); titandioxid (E171).
250 mg kapslen indeholder desuden: Indigotin (E132).

Blæk anvendt på 125 mg kapsler: Shellac; propylenglycol; koncentreret ammoniakopløsning; kaliumhydroxid; jernoxid, sort (E172).

Blæk anvendt på 250 mg kapsler: Shellac; propylenglycol; natriumhydroxid; povidon; titandioxid (E171).

Markedsføring i Danmark
Axellia Pharmaceuticals ApS
Dalslandsgade 11
DK - 2300 København S

Revideret i november 2008.

Darley Leaflets Wellington Road, Burton-on-Trent, Staffordshire, DE14 2AD. Telephone: 01283 564936 • Fax 01283 545688 • E-mail mailbox@darleylimited.co.uk							
<i>Darley Job No.:</i> 10823	<i>Customer:</i> Encap Drug Delivery	<i>Product:</i> Vancomycin AIPILDK	<i>Customer Ref No.:</i> 21194-24	<i>Product Licence No.:</i> N/A	<i>Size:</i> 297mm x 105mm	<i>Colours:</i> Black – Both Sides	<i>Originated By:</i> Graham
<i>Date Originated:</i> 16/04/2009	<i>Updated By:</i> Graham	<i>Date Updated:</i> 22/04/2009	<i>Spell Checked By:</i> N/A	<i>Operator Check:</i> Graham	<i>2nd Check By:</i> PC	<i>Proof No:</i> 3	<i>Date Proofed:</i> 22/04/2009