

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Syntocinon®, næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis oxytocin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den seneste version af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Syntocinon
3. Sådan skal du bruge Syntocinon
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Syntocinon påvirker mælkekirtlerne, så mælken lettere løber til.

Syntocinon lindrer brystspænding ved amning.

Lægen kan have givet dig Syntocinon til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Syntocinon

Brug ikke Syntocinon:

- Hvis du er allergisk over for det aktive stof oxytocin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Syntocinon (angivet i pkt.6).
- Hvis du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen hvis:

- du havde komplikationer i forbindelse med graviditeten.

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du bruger Syntocinon næsespray.

Brug af anden medicin sammen med Syntocinon

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Du kan bruge Syntocinon sammen med anden medicin.

Brug af Syntocinon sammen med mad og drikke

Ikke relevant.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke bruge Syntocinon under graviditet.

Amning

Syntocinon bliver udskilt i modermælken i små mængder.

Du kan bruge Syntocinon kortvarigt i ammeperioden.

Fertilitet

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel

Trafik- og arbejdssikkerhed

Syntocinon kan hos enkelte give sammentrækninger i livmoderen, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Syntocinon

Syntocinon næsespray indeholder


- propylparahydroxybenzoat (E 216) og methylparahydroxybenzoat (E 218), der kan give allergiske reaktioner (de kan også opstå efter endt behandling) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.
- sorbitol (E 420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge Syntocinon

Dosering:

1 pust i det ene næsebor ca. 5 minutter, før du begynder at amme.

Brugsanvisning



1. Fjern beskyttelseshætten og hold flasken lodret.
2. Inden du tager sprayen i brug første gang, skal du trykke et par gange, indtil Syntocinon kommer ud af flasken i en fin tåge. Herefter er næsesprayen klar til brug.
3. Anbring sprayen mellem fingrene. Før spidsen på flasken op i det ene næsebor, mens du sidder ret op. Tryk én gang samtidig med, at du trækker vejret blidt ind gennem næsen.
4. Sæt beskyttelseshætten på igen efter brug.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Syntocinon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Syntocinon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Syntocinon næsespray.

Hvis du har glemt at bruge Syntocinon

Brug Syntocinon næste gang du ammer.

4. Bivirkninger

Syntocinon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ingen alvorlige bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Sammentrækninger i livmoderen.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hovedpine, kvalme, allergisk hududslæt.

Hyppigheden er ikke kendt: Irritation af næseslimhinden.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
- Før åbning af flasken: Opbevar Syntocinon ved 2° C til 8° C.
- Efter åbning: Opbevar Syntocinon ved almindelig temperatur (15° C til 25° C).
- Brug ikke Syntocinon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Syntocinon næsespray er kun holdbar i 1 måned efter, at næsesprayen er taget i brug første gang.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Syntocinon indeholder:

- Aktivt stof: oxytocin 6,7 mikrogram pr. dosis.
- Øvrige indholdsstoffer: propylparahydroxybenzoat (E 216), methylparahydroxybenzoat (E 218), chlorbutanol, dinatriumphosphat, citronsyre, natriumchlorid, sorbitol (E 420), glycerol, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Syntocinon er en klar, farveløs væske. Syntocinon er i en brun glasflaske med pumpeanordning.

Flasken indeholder 5 ml næsespray, hvilket svarer til cirka 47 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Defiante Farmacêutica S.A.
Rua dos Ferreiros, 260
9000-082 Funchal, Portugal

Fremstiller:

Delpharm Hunigue
26, rue de la Chapelle
668333 Huningue Cedex, Frankrig

Lokale repræsentant:

Swedish Orphan Biovitrum A/S
Tlf: + 45 32 96 68 69
e-mail: mail.dk@sobi.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret Februar 2013