

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vancocin 125 mg kapsler, hårde

Vancocin 250 mg kapsler, hårde

vancomycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Vancocin
3. Sådan skal du bruge Vancocin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vancocin er et antibiotikum. Vancocin virker ved at dræbe bakterier. Vancocin bruges mod tarmbetændelse, som skyldes bakterien *Clostridium difficile*. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vancocin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Vancocin:

- Hvis du er overfølsom over for vancomycin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Vancocin

Hvis slimhinden i din tarm er beskadiget, kan Vancocin optages i dit blod. Lægen vil i dette tilfælde tage en blodprøve.

Brug af anden medicin sammen med Vancocin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Vancocin sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Vancocin sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Vancocin.

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du må kun tage Vancocin efter lægens anvisning.

Amning: Vancocin bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Vancocin. Spørg lægen.

3. Sådan skal du tage Vancocin

Brug altid Vancocin nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Din læge vil normalt foreslå følgende dosis:

Voksne: 500 mg 4-6 gange i døgnet

Børn: 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 4-6 doser

Du skal synke kapslen med noget væske. Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for meget Vancocin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Vancocin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Vancocin

Hvis du glemmer at tage en kapsel, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du glemmer at tage flere kapsler, skal du fortælle det til din læge. Du skal tage alle de kapsler, som din læge har bedt dig om. Du må ikke holde op med at tage kapslerne, når du begynder at få det bedre. Du kan nemlig få det værre igen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis slimhinden i din tarm er beskadiget, og Vancocin optages i dit blod, kan du få følgende bivirkninger:

- Forskellige reaktioner i huden (udslæt, kløe og rødme).
- Lavt blodtryk eller nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader i blodet ved meget høje doser.
- Nyrebetændelse og ændret nyrefunktion.
- Overfølsomhed, kulderystelser, feber og kvalme.

Hvis du får udslæt med blærer, skal du kontakte din læge med det samme. Du skal også kontakte din læge, hvis du får besvær med at høre eller besvær med at trække vejret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring

Opbevar Vancocin utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Vancocin ved over 25°C.

Anvend ikke Vancocin efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Vancocin indeholder:

Vancocin 125 mg kapsler, hårde:

Det virksomme indholdsstof i Vancocin er vancomycin. De øvrige indholdsstoffer er Macrogol 6000; gelatine; carmoisin (E122); titandioxid (E 171); jernoxid, rød (E 172); jernoxid, gul (E 172); quinolingult (E104), patent blue V (E131).

Vancocin 250 mg kapsler, hårde:

Det virksomme indholdsstof i Vancocin er vancomycin. De øvrige indholdsstoffer er Macrogol 6000; gelatine; titandioxid (E 171); jernoxid, rød (E 172); jernoxid, gul (E 172); jernoxid, sort (E 172).

Utseende:

Vancocin 125 mg er en rosa og grå kapsel. Vancocin 250 mg er en brun og brun kapsel.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

FarmaPlus AS
Sørkedalsveien 10 B
NO – 0369 OSLO
Norge

Fremstiller:

Agila Specialties Polska Sp.z.o.o
10 Daniszewska St.,
03-230 Warszawa
Polen

Denne indlægsseddel blev senest revideret 23.05.2013