

Indlægsseddel: Information til brugeren

Prometazin "ERA", 25 mg tabletter

Prometazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Prometazin "ERA" til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Overview over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Prometazin "ERA"
3. Sådan skal du tage Prometazin ERA"
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

Prometazin "ERA" indeholder:

Prometazin "ERA" 25 mg, tabletter indeholder

Det aktive indholdsstof er:

Prometazinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer er:

Titandioxid E 171
Kartoffelstivelse
Lactosemonohydrat
Magnesiumstearat
Talcum
Propylenglycol
Hypromellose

Pakningsstørrelse

100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

ERA Medical ApS

Weidekampsgade 15, st. tv.

2300 København S

Tlf. 40827535

e-mail: edward__rasmussen@hotmail.com (bemærk 2 stk. underscore)

Fremstiller:

Viminco A/S

Lodhusvej 11

4230 Skælskør

Postboks 119

1. Virkning og anvendelse

Prometazin "ERA" indeholder et stof (antihistamin), som virker mod transportsyge, allergi og søvnløshed.

Du kan bruge Prometazin "ERA" ved allergiske lidelser som nældefeber og helårssnue samt ved transportsyge og søvnløshed. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse.

Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Prometazin "ERA"

Du er overfølsom over for det aktive indholdsstof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Prometazin "ERA" tabletter

Særlige forholdsregler

Tal med lægen inden du tager Prometazin "ERA", hvis du har

- Grøn stær eller for højt tryk i øjet
- Mavesår
- Forsnævring af tolvfingertarmen
- Vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (Prostata) eller forsnævret blærehalskirtel
- Gentagne perioder med vejrtrækningsstop mens du sover (søvn dyspnø)
- Astma
- Bronkitis eller udvidelse af bronkierne
- Hjertesygdom
- Epilepsi
- Lever og nyresvigt
- Abnorm muskeltræthed (myastenia gravis)
- Hjertesygdomme

Du bør ikke tage Prometazin "ERA" til børn og unge med tegn og symptomer på Reye's syndrom (akut hjernelidelse af ukendt årsag).

Hvis du skal have lavet hudprik test (allergitest), skal du ikke bruge Prometazin "ERA" mindst 48 timer inden testen.

Prometazin "ERA" kan forstærke den sløvende effekt af beroligende midler, midler mod psykiske lidelser og sovemidler.

Alkohol kan forstærke den sløvende virkning af Prometazin "ERA".

Hvis du tager Prometazin "ERA" kan nogle graviditetstest give forkerte resultater. Prometazin "ERA" kan give tåreflod og problemer for kontaktlinsebrugere.

Du skal undgå stærkt sollys, mens du er i behandling med Prometazin "ERA".

Brug af Prometazin "ERA" med mad og drikke

Du kan tage Prometazin "ERA" sammen med mad og drikke

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Prometazin "ERA"

Prometazin "ERA" indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos læge eller apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Prometazin under graviditet, men ikke de sidste 2 uger før forventet fødsel. Tal med lægen

Amning

Hvis du ammer, må du ikke bruge Prometazin "ERA".

Trafik og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Prometazin "ERA" virker sløvende og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken i væsentlig grad.

Brug af anden medicin

Du kan bruge Prometazin "ERA", men tal først med lægen, hvis du er i behandling med

- Medicin mod angst, spænding og uro
- Nervemedicin
- Sovemedicin
- Medicin mod depression (MAO-hæmmere)

Fortæl altid læge eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. Det gælder også den medicin, som ikke er på recept. Naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Prometazin "ERA"

Allergiske sygdomme:

Voksne og børn over 15 år: 25 mg 2-4 gange daglig.

Prometazin "ERA" tabletter kan ikke bruges til børn under 15 år.

Transportsyge:

Voksne og børn over 15 år: 25 mg 30-60 minutter før afrejse.

Prometazin "ERA" tabletter kan ikke bruges til børn under 15 år.

Søvnløshed:

Voksne: 25 mg til
natten.

Må ikke anvendes til børn.

Har du taget for meget Prometazin "ERA"?

Kontakt lægen, skadestuen eller apotek hvis De har taget for meget Prometazin "ERA" end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Symptomer på overdosis kan være dødsghed, svimmelhed, overstadighed, forvirring, sløring af bevidsthed, hallucinationer, angst, hurtig puls, udvidelse af pupillerne, mundtørhed, uro, chok og kramper.

Har du glemt at bruge Prometazin "ERA"

Hvis du kommer til at springe en dosis over, fortsætter du bare med næste dosis. Du skal ikke tage dobbeltdosis.

4. Bivirkninger.

Prometazin "ERA" kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Ændringer i blodets sammensætning og en alvorlig form for blodmangel (hæmolytisk anæmi) der kan vise sig ved træthed, hudblødning og infektioner.

Søg straks læge

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Overfølsomhedsreaktioner, fx pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt læber og hals, besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring eventuelt 112

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 af 100 behandlede):

Døsighed.

Mundtørhed som ved længere tids brug giver huller i tænderne og skader i mundens slimhinde.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Svimmelhed rastløshed, hovedpine, mareridt, træthed, desorientering, øjentørhed, forstyrrelser i evnen til at de skarpt, forstoppelse og manglende evne til at tømme blæren.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Sløret syn

Gulsot

Meget sjældne bivirkninger (Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Nældefeber, udslæt og kløe.

Desuden kan følgende bivirkninger optræde, Besvær med at udføre visse bevægelser, muskelkrampe, trækning i ansigtet, hjertebanken, unormal hjerterytme, for lavt blodtryk (tendens til besvimelse), mangel på appetit, irritation af mave, overfølsomhed af huden for lys.

Små børn og ældre er særligt udsatte for at få disse bivirkninger.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Prometazin "ERA" utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Prometazin "ERA" efter den udløbsdato, der er opført i pakningen.

6. Yderligere oplysninger

Denne indlægsseddel blev senest revideret:

23. januar 2016.