

Fenytoin DAK 100 mg tabletter

Phenytoin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Fenytoin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fenytoin DAK
3. Sådan skal du tage Fenytoin DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fenytoin DAK (herefter kaldet Fenytoin) er et krampestillende middel til behandling af epilepsi og til forstyrrelser i hjerterytmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fenytoin DAK

Tag ikke Fenytoin hvis du er overfølsom over for phenytoin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Fenytoin

Tal med lægen inden du tager Fenytoin , hvis du:

- er ældre
- har en leversygdom
- har nedsat nyrefunktion
- er kommet slemt til skade og har traumer
- er blevet opereret for nylig eller har forbrændinger
- har sukkersyge
- er fejllærnet
- har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)
- har et kronisk alkoholforbrug

Hvis du pludselig stopper med at tage Fenytoin, kan du få flere epileptiske anfald. Behandlingen skal derfor nedtrappes over flere måneder efter aftale med din læge.

Hvis du tager p-piller, skal du være opmærksom på, at Fenytoin nedsætter p-pillernes virkning. Du skal derfor bruge anden prævention, mens du er i behandling med Fenytoin. Tal med lægen.

Omhyggelig tandpleje er nødvendig for at undgå øget vækst af tandkødet, som er en bivirkning ved Fenytoin.

Fenytoin kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- tabletter mod sukkersyge (tolbutamid, repaglinid)
- medicin mod mavesår (cimetidin, omeprazol)
- blodfortyndende medicin (warfarin)
- medicin til alkoholafvænning (disulfiram)
- medicin mod gigt (phenylbutazon)
- medicin mod tuberkulose (isoniazid, rifampicin)
- hjertemedicin (amiodaron, calciumantagonister, digoxin, furosemid)
- p-piller eller minipiller
- binyrebarkhormoner
- anden medicin mod epilepsi
- medicin mod grøn stær (azetazolamid)
- medicin mod skizofreni og psykoser (quetiapin, clozapin, risperidon)
- medicin mod Parkinsons sygdom (levodopa)
- medicin mod astma (theophyllin)
- medicin til at hæmme immunforsvaret (ciclosporin, tamoxifen, imatinib, tacrolimus)
- medicin mod infektion eller svamp (itraconazol, fluconazol, quinolonr, doxycyklin, chloramphenicol, sulfamethizol, sulfamethoxazol, trimethoprim)
- medicin mod HIV (saquinavir)
- medicin mod depression
- naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum

Det kan være nødvendigt at tage folinsyretabletter, mens du er i behandling med Fenytoin. Dette aftales med lægen.

Brug af Fenytoin sammen med mad og drikke

Du kan tage Fenytoin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Fenytoin. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Fenytoin efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Fenytoin virker sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

3. Sådan skal du tage Fenytoin DAK

Tag altid Fenytoin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten med rigelig væske; den kan eventuelt deles eller knuses.

Voksne og børn

Dosis er individuel og afhængig af din sygdom.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Fenytoin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Fenytoin, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering kan være svimmelhed, sløvhed, forvirring, hallucinationer, ufrivillige og uvilkaarlige øjenbevægelser, lammelser i øjenmuskulaturen, nedsat vejtrækning, kvalme, opkastninger, manglende koordinering af bevægelser, overdrevne reflekser, taleforstyrrelser eller kramper.

Ved kraftig overdosering kan der opstå koma og hjerneskade.

Hvis du har glemt at tage Fenytoin

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Fenytoin

Hvis du pludselig stopper med at tage Fenytoin, kan du få flere epileptiske anfald. Behandlingen skal derfor nedtrappes over flere måneder efter aftale med din læge.

4. Bivirkninger

Fenytoin kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Hævelse af tandkød, eksem, nældefeber.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 -10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Uren hud (akne), øget hårvækst i ansigt og på krop.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Koma.

Ikke alvorlige: bevægelsesforstyrrelser, smasken, ufrivillige tungebevægelser, sløret tale, taleforstyrrelser, følelse af at være forvirret, overdrevne reflekser, sløvhed, svimmelhed, søvnløshed, nervøsitet, muskeltrækninger, hovedpine, kvalme, opkastninger, forstoppelse, mavekatar, smagsforstyrrelser, forhøjet blodsukker, svækket immunsystem.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Udslett med blærer og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber, overfølsomhedsreaktion (f.eks. feber, udslett, hævede lymfeknuder, leverbetændelse, nyresvigt, blodpropper), hallucinationer.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hjertestop, betændelse i blodkar, bleghed og træthed (blodmangel), påvirkning af lungerne og vejrtrækningsbesvær, nyrepåvirkninger med blod i urinen, feber, smerter over lænden, aftagende urinproduktion, afskalning af huden, muskelnedbrydning med smerter, feber og rød urin, akut anfald af stofskiftesygdommen porfyri, lymfeknudekræft, der kan vise sig ved hævede lymfeknuder på halsen, i armhulerne og lysken, leverskader, akut psykose, vedvarende muskelsvækkelse med smerter, ømhed, kramper, mørk urin og influenzalignende symptomer (rhabdomyolyse).

Fenytoin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. folinsyre eller levertal.

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Sådan opbevarer du Fenytoin DAK

Opbevar Fenytoin utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Fenytoin ved almindelig temperatur.

Brug ikke Fenytoin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Fenytoin DAK 100 mg tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er phenytoin. De øvrige indholdsstoffer er gelatine, glycerol 85% (E 422), kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Fenytoin DAK er en rund, hvid tablet med delekærv og findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2013