

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glucobay® 100 mg tabletter

Acarbose

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Glucobay til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Glucobays virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glucobay
3. Sådan skal du tage Glucobay
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Glucobay
6. Yderligere oplysninger

1. GLUCOBAYS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Glucobay er til behandling af ikke-insulinkrævende diabetes (type 2 diabetes mellitus). Glucobay forsinker optagelsen af glucose i tarmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GLUCOBAY

Tag ikke Glucobay hvis:

- Du er overfølsom over for acarbose eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- Du lider af alvorligt nedsat nyrefunktion.
- Du lider af kroniske tarmsygdomme, der giver forstyrrelser af fordøjelsen.
- Du lider af øget luft i maven eller hindringer af tarmpassagen (brok, tarmslyng eller sår i tarmen).

Vær ekstra forsigtig med at tage Glucobay

Under behandling med Glucobay kan du få mavesmerter eller maveirritation, hvis du spiser glukose og glukoseholdig mad. Hvis mavesmerter eller maveirritation bliver kraftigt forværret, på trods af overholdelse af aftalt kostplan, skal du kontakte lægen.

Brug af anden medicin

Tal med lægen hvis du tager:

- Medicin mod diabetes (sulfonylurinstoffer og insulin). Hvis du tager Glucobay sammen med sulfonylurinstoffer eller insulin, skal du evt. have dosis af disse nedsat for at undgå for lavt blodsukker. Ændring af dosis skal ske i samråd med lægen. Hvis du får for lavt blodsukker, skal du indtage druesukker (glukose/dextrose), da almindeligt sukker og brød ikke virker.
- Medicin mod diaré (kultabletter).
- Kolesterolnedsættende medicin (cholestyramin).
- Medicin der fremmer fordøjelsen (fordøjelsesfremmende enzymer).

- Hjerteremedicin (digoxin). Du skal måske have ændret dosis. Dette skal foregå i samråd med lægen.

Hvis du tager Glucobay og neomycin samtidig, kan det medføre en lavere stigning i dit blodsukker efter et måltid end normalt. Det kan også medføre hyppigere eller mere alvorlige gener fra maven. Hvis dine symptomer er alvorlige, skal du kontakte lægen. Lægen kan foreslå en midlertidig nedsættelse af din dosis af Glucobay.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept.

Brug af Glucobay sammen med mad og drikke

Du skal tage Glucobay ved begyndelsen af et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage Glucobay, hvis du er gravid.

Amning:

Erfaringer med Glucobay er begrænsede. Du bør derfor ikke tage Glucobay, hvis du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucobay påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE GLUCOBAY

Tag altid Glucobay nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Voksne:

Startdosis er ½ tablet (50 mg) 3 gange daglig.

Efter 4-8 uger kan du gradvist øge dosis til 1 tablet (100 mg) 3 gange daglig.

Du skal tage tabletterne i begyndelsen af måltidet. Du kan synke tabletterne hele med lidt vand eller tygge dem.

Børn:

Sikkerhed og virkning af Glucobay hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Glucobay tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Glucobay, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er luft i maven og diaré.

Ved overdosering bør du ikke indtage kulhydrater i de efterfølgende 4-6 timer, da det kan forværre symptomerne.

Hvis du har glemt at tage Glucobay

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt. Er dette tæt på tidspunktet for næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Glucobay kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Gulsot.

Meget sjældne bivirkninger (hyppighed ukendt):

Tarmslyng, leverbetændelse, blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader), tarmsygdom med gasfyldte blærer i tarmslimhinden (pneumotosis cystoidis intestinalis).

Søg straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige – meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): Luft i maven, diaré, mavesmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 patienter): Kvalme, opkastning, halsbrand/sure opstød, forstyrrelser i levertal.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Hævelser eller vand i kroppen.

Meget sjældne bivirkninger (hyppighed ukendt): Overfølsomhedsreaktioner (udslæt, rødmen af huden, nældefeber).

Desuden er der især fra Japan indrettet bivirkninger som leversygdom, unormal leverfunktion og leverskade.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. SÅDAN OPBEVARER DU GLUCOBAY

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale pakning.

Opbevares under 25 °C.

Brug ikke Glucobay efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke tabletterne hvis de viser tydelige tegn på ændringer i udseende.

Spørg på apoteket hvordan Du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Glucobay indeholder:

- Aktivt stof:acarbose.
- Øvrige indholdsstoffer: cellulose, mikrokrySTALLinsk; silica, kolloid vandfri; magesiumstearat; majsstivelse.

Glucobays udseende og pakningstørrelse

100 mg tabletter: Hvid til råhvid, aflange tabletter med delekærv, mærket G100. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Pakningsstørrelse:

100 mg tabletter i blister 120 stk.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bayer Schering Pharma AG, D-13342 Berlin, Tyskland.

Repræsentant i Danmark

Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S

Denne indlægsseddel blev senest revideret: december 2012