

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Atropin "PS" 0,5 % og 1 %, øjendråber, opløsning

Atropin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Atropin "PS" til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atropin "PS"
3. Sådan skal du bruge Atropin "PS"
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Atropin "PS" øjendråber er et middel til udvidelse af pupillerne.

Du skal bruge Atropin "PS" ved betændelse i regnbuehinden eller hornhinden eller ved undersøgelse af øjnene.

Lægen kan have givet dig Atropin "PS" for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ATROPIN "PS"

Brug ikke Atropin "PS", hvis

- du er overfølsom over for atropin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atropin "PS"
- du har grøn stær (forhøjet tryk i øjet), eller du har mistanke om det f.eks. ved tågesyn eller regnbuesyn.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Atropin "PS"

Tal med lægen, inden du bruger Atropin "PS", hvis

- du har smerter, rødme og irritation (inflammation) i øjet.

Vær opmærksom på

- Hvis du bruger Atropin "PS" i en længere periode, er der større risiko for bivirkninger som forhøjet tryk i øjet med hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn, irritation, hævelse, og betændelse i senhinden (det hvide i øjet). Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod

- grøn stær (pilocarpin)
- depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere).

Hvid du bruger andre øjendråber end Atropin "PS", så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Atropin "PS" og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Atropin "PS" under graviditet.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Atropin "PS" er nødvendig, da atropin går over i modermælken, og mælkemængden bliver nedsat. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atropin "PS" kan give bivirkninger som sløret syn, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Atropin "PS"

Atropin "PS" er konserveret med benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger øjendråberne, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ATROPIN "PS"

Brug altid Atropin "PS" nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Atropin "PS" 0,5 %

Den sædvanlige dosis er

Børn 3 – 7 år

Betændelse i horn- eller regnbuehinden: 1 dråbe 3 gange daglig, ved bedring vil lægen normalt nedsætte dosis til 1 dråbe daglig.

Inden øjenundersøgelse: 1 dråbe 3 gange daglig i begge øjne i 3 døgn før undersøgelsen.

Atropin "PS" 1,0 %

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn (8 – 14 år)

Betændelse i horn- eller regnbuehinden: 1 dråbe 3 gange daglig, ved bedring vil lægen normalt nedsætte dosis til 1 dråbe daglig.

Inden øjenundersøgelse: 1 dråbe 3 gange daglig i begge øjne i 3 døgn før undersøgelsen.

Brugervejledning

Træk ned i nederste øjenlåg, og dryp 1 dråbe ned i lommen mellem øjet og øjenlåget.

Undgå at beholderens spids berører hud eller øjne.
Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan derfor sommetider smages.
Virkningen begynder efter ½-1 time og aftager lidt efter lidt i løbet af 8 døgn.

Hvis du har brugt for meget Atropin "PS"

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Atropin "PS", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Symptomer på overdosering er forhøjet blodtryk, ansigtsrødmen, feber, kvalme, opkastning, hurtig vejrtrækning, uro, ophidselse, psykotiske reaktioner, uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. I alvorlige tilfælde bevidstløshed med vejrtrækningsstop.

Hvis du har glemt at bruge Atropin "PS"

Hvis du har glemt en dosis øjendråber, så dryp øjnene, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal dryppe øjnene, så spring den glemte dosis over. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Atropin "PS"

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Atropin "PS" kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter.

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hallucinationer. Kan være eller blive alvorlige. Tal med lægen.
- Forvirring, ophidselse.
- Øjensymptomer som svie ved drypning, synsforstyrrelser og øget lysfølsomhed.
- Ansigtsrødmen, feber.
- Tørhed i munden.
- Forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter.

- Vandladningsbesvær.
- Allergiske reaktioner ved langvarig brug.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Tørhed af næseslimhinden.
- Røde øjne.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Atropin "PS" utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Atropin "PS" ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Atropin "PS" efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Du må højst bruge øjendråberne 1 måned efter åbning.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. YDERLIGERE INFORMATION

Atropin "PS", øjendråber, opløsning 0,5 % og 1 % indeholder

Aktivt stof: Atropinsulfat (5 mg/ml og 10 mg/ml).

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, borsyre og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Atropin "PS" øjendråber er en klar, farveløs væske.

Pakningsstørrelser

0,5 %: 5 ml

1 %: 5 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pharma-Skan ApS

Adelgade 27

8660 Skanderborg

Fremstiller

Pharma-Skan ApS

Adelgade 27

8660 Skanderborg

Denne indlægsseddel er sidst revideret september 2008