

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

IMIGRAN®

25 mg suppositorier

Sumatriptan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Imigran til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran.
3. Sådan skal du bruge Imigran.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Imigran tilhører gruppen af triptaner.
- Ved migræne udvider blodkarrene sig i hjernen. Imigran virker ved at trække blodkarrene sammen. Det afhjælper hovedpine og andre symptomer på migræne, herunder kvalme, opkastning og følsomhed over for lys.
- Du kan bruge Imigran til anfaldsbehandling af migræneanfald, med eller uden aura.

Lægen kan have givet dig Imigran for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran

Tag ikke Imigran

- hvis du er overfølsom over for sumatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du lider af åreforkalkning, anfald af brystmerter, både i hvile og efter fysisk anstrengelse.
- hvis du har sammentrækninger af blodkarrene eller sygdomme i blodkarrene.
- hvis du har haft blodprop ved hjertet.
- hvis du tidligere har haft hjerneblødning, blodprop i hjernen eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen.
- hvis du har en meget dårligt fungerende lever.
- hvis du har moderat til alvorligt forhøjet blodtryk, med eller uden behandling, eller ubehandlet let forhøjet blodtryk.
- Hvis du bruger medicin mod depression(MAO-hæmmer). Vær opmærksom på, at du tidligst må tage Imigran to uger efter, du er holdt op med MAO-hæmmeren.
- Hvis du samtidig bruger anden medicin mod migræne (ergotamin eller andre triptaner).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Imigran

- Tal med lægen, inden du bruger Imigran, hvis du:
- ikke tidligere har fået stillet en migrænediagnose.
 - har fået at vide, at du har en særlig form for migræne (med lammelser eller andre alvorlige symptomer).
 - har eller har haft hjerteproblemer, særlig hvis du ryger, bruger nikotinpræparater, er en kvinde i overgangsalderen eller en mand over 40 år.
 - har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 - har haft krampeanfald.
 - er overfølsom over for sulfonamid (mod betændelse).
 - bruger visse typer medicin mod depression (SSRI/SNRI-midler) eller anden migrænemedicin (triptaner). Hvis du bruger Imigran sammen med disse præparater, kan du risikere at udvikle et såkaldt serotonin syndrom. Det viser sig ved feber, muskelstivhed, hurtig vejrtrækning, svedtendens, forvirring og uro. Det kan udvikle sig livstruende.
 - er i behandling for let forhøjet blodtryk.

Kontakt læge eller skadestue, hvis du efter indtagelse af Imigran får trykken for brystet eller stærke smerter i brystet med udstråling til halsen. Det kan være tegn på akut hjertelidelse (blodprop ved hjertet).

Tag ikke mere Imigran end du har aftalt med lægen. Hvis du tager for meget Imigran kan du få kronisk hovedpine eller forværret migræne.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager:

- anden medicin mod migræne (ergotamin eller triptaner) sammen med Imigran. Vent mindst 24 timer efter brug af ergotamin eller andre triptaner, inden du bruger Imigran og vent mindst 6 timer efter indtagelse af Imigran før du bruger ergotamin eller andre triptaner.
- medicin mod depression (MAO-hæmmere og SSRI/SNRI præparater).
- naturlægemidler, der indeholder perikum (Hypericum perforatum), da risikoen for bivirkninger bliver større.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Imigran efter aftale med lægen.

Amning:

- Imigran går over i modermælken. Undlad at amme i indtil 12 timer efter du har brugt Imigran. Modermælk der er malket ud i denne periode skal smides ud.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imigran kan hos enkelte give bivirkninger (døsighed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Imigran

Tag Imigran så tidligt som muligt efter migræneanfaldet er begyndt. Du kan ikke bruge Imigran til forebyggelse af migræne.

Den sædvanlige dosis er

Voksne (over 18 år):

1 suppositorie (stikpille) indført i endetarmen.

Du kan tage Imigran når som helst under anfaldet, men helst i starten. Hvis det første suppositorie ikke virker, skal du ikke tage mere Imigran mod dette anfald, da en ekstra dosis normalt ikke hjælper. Hvis migrænen vender tilbage inden for 1 døgn, kan du tage yderligere 1 suppositorie, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser.

Du bør ikke bruge mere end 2 suppositorier i døgnet.

Ældre (over 65 år):

Der er ingen erfaring med brug af Imigran hos personer over 65 år. Følg lægens anvisning.

Børn og unge (under 18 år):

Der er ingen erfaring med brug af Imigran hos børn og unge under 18 år. Følg lægens anvisning.

Brug altid Imigran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Vejledning i brugen af Imigran suppositorier

- Gå på toilettet, hvis du trænger.
- Vask hænder.
- Tag suppositoriet ud af blisterpakningen.
- Det kan være lettere at indføre suppositoriet, hvis du sætter dig på hug eller bøjer dig fremover.
- Indfør suppositoriet i endetarmen med den flade ende først.
- Vask hænder.
- Undgå at gå på toilettet den første time derefter.

Hvis du har brugt for mange Imigran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere

Imigran, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

4. Bivirkninger

Imigran kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
- Smerter i brystet evt. med udstråling til halsen på grund af hjertekrampe eller blodprop i hjertet. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Synstab. Kontakt straks læge.
- Akutte smerter i maven, opkastninger, blødning fra endetarmen og påvirket almentilstand pga. af en tarmlidelse kaldet iskæmisk colitis. Kontakt omgående læge eller skadestue.
- Hvide "døde" fingre og tæer. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Smerte, varmekølelse, kuldefølelse, tyngde og trykken overalt i kroppen, inkl. bryst og hals. Det kan være kraftigt, men er ofte kortvarigt.
- Svaghed og træthed, svimmelhed, døsighed.
- Føleforstyrrelser, herunder prikkende, snurrende fornemmelser eller følelseløshed i huden og nedsat følelse ved berøring.
- Forbigående blodtryksstigning, rødme.
- Kvalme og opkastning kan forekomme, men skyldes ofte selve migrænen.
- Muskelsmerter.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Hududslæt, nældefeber.
- Rysten, ufrivillige bevægelser af kroppen, rykvisse ufrivillige øjenbevægelser, dobbeltsyn, nedsat syn, flimren.
- Hjertebanken.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Diarré.
- Smerter i leddene.
- Nakkestivhed.
- Angst.
- Kraftig sveden.

Imigran kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Imigran utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Imigran ved temperaturer over 30 °C.
- Brug ikke Imigran efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Imigran, 25 mg, suppositorier indeholder:

Sumatriptan 25 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Witepsol W32 (hårdfedt).

Pakningsstørrelser:

Imigran suppositorier fås i pakninger med 6 og 12 suppositorier.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2013.



385380103

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700