

SEBIPROXTM

Shampoo 1,5%

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Sebiprox®.
3. Sådan skal du bruge Sebiprox.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

SEBIPROX indeholder:

- Sebiprox shampoo 1,5%
- Det aktive indholdsstof i Sebiprox er ciclopiroxolamin 1,5 g pr. 100 g shampoo.
- De øvrige indholdsstoffer er: Natriumlauryl ethersulfat 70%, cocamidopropylbetain, dinatriumphosphatdodecahydrat, citronsyremonohydrat, coconut diethanolamin, hexylenglycol, cetylalcohol, polysorbat 80, polyquaternium-10, natriumhydroxid, parfume (Fragrance AF17050 - indeholder fortrinsvis dipropyleneglycol), rensat vand.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Stiefel Laboratories (UK) Ltd., Holtspur Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Bucks HP10 0AU, Storbritannien

Fremstilling:

Stiefel Laboratories Ireland Ltd.,
Finisklin Business Park,
Sligo, Irland

Repræsentant i Danmark:

Stiefel Laboratories (Nordic) ApS
Havnegade 39, 1058 København K

1. Virkning og anvendelse

- Sebiprox er en shampoo, som indeholder et svampemiddel.
- Sebiprox anvendes til behandling af skæl i hovedbunden.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Sebiprox

• Brug ikke Sebiprox hvis:

du er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Sebiprox shampoo.

• Særlige forholdsregler

Sebiprox er beregnet til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene. Hvis du får shampoo i øjnene, skål du skylle med vand.

Sikkerhed og virkning af Sebiprox er ikke testet på børn.

7435D

- **Graviditet og amning:**

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

- **Graviditet**

Du kan bruge Sebiprox under graviditet.

- **Amning**

Du kan amme, selv om du bruger Sebiprox.

- **Brug af anden medicin**

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitamin- og mineraler.

Det er ikke sandsynligt at Sebiprox og anden medicin, der bruges samtidig, kan påvirke hinanden. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.

3. Sådan skal du bruge Sebiprox

- **Dosering**

Brug Sebiprox 2 - 3 gange om ugen.

Fugt håret og kom så meget shampoo i håret at der dannes rigeligt skum.

Hovedbund og områderne omkring masseres kraftigt med fingerspidserne.

Skyl håret grundigt og gentag behandlingen.

Shampooen skal forblive i kontakt med hovedbunden i 3-5 minutter.

Den anbefalede behandlingsperiode er 4 uger.

En mild shampoo kan anvendes ind imellem behandlingerne med Sebiprox shampoo.

Børn: Du må kun bruge Sebiprox til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Hvis du synes at virkningen af Sebiprox er for kraftig eller for svag, skal du kontakte lægen eller apoteket.

- **Har du glemt at bruge Sebiprox?**

Genoptag behandlingen som beskrevet i afsnittet om Dosering.

4. Bivirkninger

Sebiprox kan som al anden medicin give bivirkninger.

- **Sjældne bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Hudirritation.

Afbryd behandlingen og kontakt lægen, hvis irritationen vedvarer.

I sjældne tilfælde, især hvor håret er kemisk skadet, gråt eller hvidt, er misfarvning set.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

- Opbevar Sebiprox utilgængeligt for børn
- Anvend ikke Sebiprox efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Afløber altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret Oktober 2006