

Azithromycin "2care4" 500 mg, filmovertrukne tabletter

Azithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Azithromycin 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Azithromycin 2care4
3. Sådan skal du tage Azithromycin 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Azithromycin 2care4 tilhører en gruppe af antibiotika, som kaldes makrolider. Disse anvendes til behandling af infektioner, som skyldes bakterier.

Du kan tage Azithromycin 2care4 til behandling af

- infektioner i luftvejene såsom bronkitis, lungebetændelse.
- infektioner i mandler og svælg samt bihulebetændelse.
- infektioner i øret.
- infektioner i hud eller blødt væv.
- infektioner i livmoderhalsen og urinvejene, som er forårsaget af bakterien chlamydia.

Lægen kan have givet dig Azithromycin 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE AZITHROMYCIN 2CARE4

Tag ikke Azithromycin 2care4

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for azithromycin, erythromycin eller andre typer af makrolidantibiotika, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for soja eller peanut.

Vær ekstra forsigtig med at tage Azithromycin 2care4

- Tal med lægen, inden du tager Azithromycin 2care4, hvis du
- har nedsat leverfunktion, alvorlig leverproblemer eller hvis de opstår under behandlingen.
 - har svært nedsat nyrefunktion.
 - har neurologiske eller psykiske sygdomme.
 - er i behandling med ergotamin (mod migræne).
 - lider af Myastenia gravis (muskelsygdom).

Da azithromycin kan øge risikoen for abnormal hjerterytme, skal du inden du påbegynder behandlingen, fortælle din læge, hvis du har oplevet følgende:

- hjerteproblemer f.eks. forstyrrelser i hjerterytmen (hjertesvigt), meget langsom hjerterefrekvens, unormal hjerterytme eller en uregelmæssighed på elektrokardiogrammet, såkaldt "langt QT syndrom".
- lav koncentration af kalium eller magnesium i blodet.

Vær opmærksom på at Azithromycin 2care4 som andre antibakterielle midler kan forårsage diarre.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- Theophyllin (anvendes mod astma).
- Warfarin eller lignende medicin, der anvendes for at forhindre blodpropper.
- Ergotamin, dihydroergotamin (til behandling af migræne).
- Cyclosporin (nedsætter immunforsvaret for at forebygge og behandle afstødning af et transplanteret organ eller knoglemarv).
- Digoxin (hjertemedicin).
- Syreneutraliserende lægemidler (anvendes ved fordøjelsesproblemer), se afsnit 3.

- Cisaprid (mavemedicin).
- Terfenadin (anvendes ved høfeber).
- Alfentanil (anvendes som smertestillende eller narkose præparat)
- Astemizol (anvendes mod allergi).

Brug af Azithromycin 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Azithromycin 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Azithromycin 2care4, hvis du er gravid, da det kan skade fostret. Tal med lægen.

Amning

Azithromycin går over i modermælken, amning bør derfor afbrydes i op til 2 dage efter behandling med azithromycin er afsluttet. Herefter kan amningen genoptages. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Azithromycin 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Azithromycin 2care4

Azithromycin 2care4 indeholder soja- og lecitin. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis du ikke tåler peanut eller soja.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE AZITHROMYCIN 2CARE4

Tag altid Azithromycin 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er Voksne og børn over 45 kg.

Dosis bør indtages som en enkelt dosis. Azithromycin 2care4 kan tages som et 3- eller 5-dagsforløb:

- 3-dages forløb: Tag 500 mg (i form af to 250 mg tbl. eller en 500 mg tablet) dagligt i 3 dage.
- 5 dages forløb: Tag 500 mg på dag 1 (to 250 mg tabletter) Tag 250 mg (en 250 mg tablet) på dag 2, 3, 4 og 5.

Ved behandling af infektioner i urinrør eller livmoderhals, som skyldes chlamydia, er dosis 1000 mg (to gange 500 mg tabletter), der tages samtidig som enkelt dosis.

Azithromycin 2care4 tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Azithromycin 2care4 tabletter til alle de anførte doseringer.

Samtidig indtagelse af Azithromycin 2care4, sammen med medicin mod fordøjelsesproblemer

Hvis du har brug for at tage et syreneutraliserende middel mod fordøjelsesproblemer, så skal du tage dine tabletter en time før eller to timer efter det syreneutraliserende middel.

Børn

Børn under 45 kg må normalt ikke få Azithromycin 2care4 500 mg tabletter.

Hvis du har taget for mange Azithromycin 2care4 filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Azithromycin 2care4 tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er magen til dem, der ses ved normal dosering.

Hvis du har glemt at tage Azithromycin 2care4

Hvis du har glemt en dosis Azithromycin 2care4 fillovertrukne tabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Azithromycin 2care4

Du bør altid fortsætte med at tage tabletterne, selv hvis du har det bedre. Hvis du holder op med at tage tabletterne for tidligt, kan infektionen genopstå, og der kan opstå bakteriel resistens over for medicinen. Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan du skal anvende dette produkt, så spørg din læge eller apoteket. Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Azithromycin 2care4 er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Azithromycin 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Søvnliggende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock. Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.
- Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
- Voldsom, hurtigt udviklet gulsot ofte med hudkløe, kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed og leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Diarre, mavesmerter, kvalme, luftafgang fra tarmen.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Appetitmangel/madlede, smagsforstyrrelser.
- Svimmelhed, hovedpine.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelseløshed i huden, udslæt, kløe.
- Nedsat syn.
- Døvhed.
- Opkastning, sure opstød/halsbrand.
- Smerter i leddene.
- Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Candidiasis (svampeinfektion), svamp i munden, infektion i skeden.
- Overfølsomhed.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Nervøsitet.
- Nedsat følelse ved berøring.
- Søvnløshed.
- Nedsat høreelse, susen for ørerne (tinnitus).
- Hjertebanken.
- Forstoppelse.
- Øget lysfølsomhed, nældefeber.
- Smerter i brystet.
- Vand i kroppen. Kontakt lægen.
- Utilpashed, kraftsløshed og svaghed.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Rastløshed og en følelse af ikke at være sig selv.
- Svimmelhed.
- Unormal leverfunktion.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Aggressive følelser og angst.
- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Uro og rastløshed.
- Mangel på lugtesans, forkerte lugteindtryk, tab af smagsevne.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Misfarvning af tunge.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Azithromycin 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Azithromycin 2care4 ved almindelig temperatur.

Tag ikke Azithromycin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Azithromycin 2care4, 500 mg, fillovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Azithromycinmonohydrat svarende til 500 mg azithromycin. Hjælpemidler: Mikrokrystallinsk cellulose, prægelatiniseret majsstivelse, natriumstivelsesglycolat, kolloid vandfri silica, natriumlaurylsulfat og magnesiumstearat.

Overtræk: Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talcum, sojalecitin, xantangummi.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende
Azithromycin 2care4 er fillovertrukne hvide eller næsten hvide, aflange, fillovertrukne tabletter med en dyb rille på den ene side og en delekærv på den anden side.

Pakningsstørrelse

Azithromycin 2care4 fås i en pakningsstørrelse á 3 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømmervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømmervej 9
6710 Esbjerg V.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2011