LIVISTO

BUSOL 4 mikrogram/ml
injektionsvæske, opløsning

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Indlægsseddel

1. Veterinærlægemidlets navn
Busol, injektionsvæske, opløsning, 4 mikrogram/ml

2. Sammensætning
1 ml indeholder:

Aktivt stof:
Buserelinacetat 4,2 mikrogram, svarende til buserelin 4 mikrogram

Hjælpestoffer:
Benzylalkohol 20 mg

Klar, farveløs væske.

3. Dyrearter
Kvæg og heste.

4. Indikationer
Cyster i æggestokkene og ægløsnings-fremkaldelse hos kvæg. Ægløsnings-fremkaldelse hos hopper.

5. Kontraindikationer
Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

6. Særlige advarsler

Særlige forholdsregler for personer, der administrerer lægemidlet til dyr
På grund af buserelins hormonelle påvirkninger under graviditet, bør kvinder, der er gravide eller kan være gravide, ikke håndtere produktet. Kvinder i den fødedygtige alder skal administrere produktet med forsigtighed.
Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænder efter brug.

I tilfælde af kontakt med huden ved hændeligt uheld skal der øjeblikkeligt vaskes af med vand og sæbe. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skylles øjnene med vand, og om nødvendigt kontaktes en læge.

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Drægtighed
Behandling med produktet er ikke relevant under drægtighed.

Diegivning
Kan anvendes under diegivning.

7. Bivirkninger
Ingen kendte.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelse ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægsseddel eller via det nationale bivirkningssystem:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

8. Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde

Kvæg
Cyster i æggestokkene: 5 ml i.m/i.v.

Kvæg
Ægløsnings-fremkaldelse: 2,5 ml i.m/i.v.

Hest
Ægløsnings-fremkaldelse: 10 ml i.m/i.v.

9. Oplysninger om korrekt administration
Ingen.

10. Tilbageholdelsestider
Slagtning: 1 døgn.
Mælk: 1 udmalkning (mindst 7 timer).

11. Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter udløbsdatoen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

12. Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse
Veterinærlægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

13. Klassificering af veterinærlægemidler
Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.

14. Markedsføringstilladelsesnumre og pakningsstørrelser
MTnr. 38547

5, 50 (10 x 5), 100 (20x5), 250 (50x5), 500 (100x5) hætteglas à 10 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

15. Dato for seneste ændring af indlægssedlen
7. november 2024

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Kontaktoplysninger

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse
aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden
Tyskland

Lokal repræsentant og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger
ScanVet Animal Health A/S
Kongevejen 66
DK-3480 Fredensborg
Tel.: +45 48 48 43 17