


Busol®

Injektionsvæske, opløsning, til kvæg og heste

Buserelin



Indlægsseddel

Navn og adresse på indehaveren af markedsføringstilladelsen samt på den indehaver af virksomhedsgodkendelse, som er ansvarlig for batchfrigivelse, hvis forskellig herfra

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller af batchfrigivelse
 aniMedica GmbH · Im Südfeld 9 · D-48308 Senden · Tyskland

Repræsentant

ScanVet Animal Health A/S · Kongevejen 66 · 3480 Fredensborg

Veterinærlægemidlets navn

Busol®, injektionsvæske, opløsning, 4 mikrogram/ml
 Buserelin

Angivelse af de(t) aktive stoffer) og andre indholdsstoffer

1 ml injektionsvæske indeholder:

Buserelinacetat4,2 µg,
 Benzylalkohol20 mg

(svarende til buserelin 4 µg)

Indikationer

Busol anvendes til behandling af follikelcyster og til ovulationsinduktion hos kvæg samt til ovulationsinduktion hos hopper.

Kontraindikationer

Ingen.

Bivirkninger

Ingen

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Dyrearter

Kvæg og heste.

Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej(e)

Kvæg:	Follikelcyster:	5 ml i.m/i.v.
Kvæg:	Ovulationsinduktion:	2,5 ml i.m/i.v.
Hest:	Ovulationsinduktion:	10 ml i.m/i.v.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end Angiveti denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Oplysninger om korrekt anvendelse

Se anvendelsesmåde.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 1 døgn.

Mælk: 1 udmalkning (mindst 7 timer).

Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C -8 °C). Beskyttes mod frost.

Efter anbrud: Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på etiketten og æsken efter EXP.

Særlig(e) advarsel/advarsler

Særlige forsigtighedsregler ved anvendelse til dyr

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis utilsigtet kontakt med huden skulle forekomme, bør de ramte områder af huden straks vaskes med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld skulle komme i øjnene, bør der straks skylles med vand og om nødvendigt bør der søges lægehjælp. Vask hænder efter brugen.

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktioner

Ingen.

Overdosering (symptomer, forholdsregler i nødstilfælde, modgift)

Ingen.

Ufortelighed

Ingen.

Særlige forholdsregler for destruktion af ikke-anvendte lægemidler eller af affald, som produceres ved anvendelse, om nødvendigt

Ikke-anvendte lægemidler til dyr skal fortrinsvis afleveres på et giftdepot. Sammen med bortskaffelse af husholdningsaffald skal det sikres, at der ikke kan foretages ulovlig fjernelse af dette affald. Lægemidler til dyr må ikke destrueres i henholdsvis spildevand eller kanalisations. Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/-leverandør eller til kommunal modtageordning.

Dato for seneste revision af indlægssedlen

08.06.2010

Andre oplysninger

Pakningsstørrelser: 5, 50 (10 x 5), 100 (20 x 5), 250 (50 x 5), 500 (100 x 5) hætteglas à 10 ml.

Lægemidlet bør ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er angivet på beholderen og den ydre pakning.

Holdbarheden efter anbrud er 28 dage.

Receptpligtig.

Vnr: 136254 (5 x 10ml), 129678 (10 ml)

ScanVet
Animal Health
3480 Fredensborg

2568/1009