

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Creon 10.000 hårde enterokapsler
Pancreatin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Creon 10.000 uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Creon 10.000.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 10.000
3. Sådan skal du tage Creon 10.000
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Creon 10.000 indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Du kan tage Creon 10.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.
- Lægen kan have givet dig Creon 10.000 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CREON 10.000

Tag ikke Creon 10.000

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for pancreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er allergisk over for svineprotein eller andre svineprodukter.
- hvis du har akut betændelse i bugspytkirtlen.
- hvis du har akut forværring af kronisk lidelse i bugspytkirtlen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Creon 10.000

Tal med lægen, inden du tager Creon 10.000, hvis du

- har svær forstoppelse,
- tarmen ikke fungerer, eller

- du har betændelse i tarmen.

Hvis du har cystisk fibrose, må du kun tage Creon 10.000 efter lægens anvisning.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Creon 10.000 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Creon 10.000 sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Creon 10.000 efter aftale med lægen.

Amning:

Du kan tage Creon 10.000, selvom du ammer.

Trafik og arbejdssikkerhed

Creon 10.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CREON 10.000

Hvis din læge har ordineret Creon 10.000 til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1–2 enterokapsler til hovedmåltiderne.


Behandlingen starter med lav dosis og bliver derefter justeret til dit behov. Du må kun ændre din dosis i samråd med lægen.

Børn:

Du må kun bruge Creon 10.000 til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Du kan synke kapslerne hele, eller du kan åbne dem og bruge granulatet som drys på f.eks. ymer. Det er vigtigt at indtage granulatet STRAKS efter at du har blandet det. Granulatet må IKKE tygges.

Indtag altid rigelig væske (2–3 liter) hver dag i de perioder, hvor du bruger Creon 10.000.



Hvis du har taget for mange Creon 10.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon 10.000, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Det gælder især for børn.

Hvis du har glemt at tage Creon 10.000

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Creon 10.000

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Creon 10.000 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

- **Meget sjældne bivirkninger**
(det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
Bindevævsforandringer i tyktarmen. Forsnævring af tyktarmen og blod i afføringen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- **Almindelige bivirkninger**
(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Mavesmerter.
- **Ikke almindelige bivirkninger**
(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
Diaré, kvalme, forstoppelse, opkastning, unormal afføring og udslæt.
- **Hyppigheden ikke kendt:**
Vægttab, irritation ved endetarmen og luft i maven.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Creon 10.000 utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Creon 10.000 ved temperaturer over 30°C.

Brug ikke kapslerne, hvis de viser tydelige tegn på nedbrydning.

Brug ikke Creon 10.000 efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Creon 10.000 hårde enterokapsler indeholder:

Aktivt stof: pankreatin svarende til

Amylase 8.000 EP-enheder

Lipase 10.000 EP-enheder

Protease 600 EP-enheder

Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000; hypromellosephthalat; cetylalkohol; triethylcitrat; dimeticon; gelatine; gul, rød og sort jernoxid (E172); titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat.

Creon 10.000 er sukker- og lactosefri.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Creon 10.000 er brune/klare kapsler.

Pakningsstørrelse

Tabletbeholder af plast med skruelåg: 100 stk

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Abbott Products GmbH · Hans-Böckler-Allee 20 · D-30173 Hannover · Tyskland

Repræsentant for Danmark:

Abbott Laboratories A/S · Emdrupvej 28 C · 2100 København Ø

Telefon 39 77 00 00

Fremstiller:

Abbott Products GmbH · Justus-von-Liebig-Strasse 33 · D-31535 Neustadt · Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2011

1074554