

INDLÆGSESSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Creon 40.000 hårde enterokapsler Pancreatin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Creon 40.000 uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Creon 40.000.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Creon 40.000's virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 40.000
3. Sådan skal du tage Creon 40.000
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Creon 40.000
6. Yderligere oplysninger

1. CREON 40.000's VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

- Creon 40.000 indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Du kan tage Creon 40.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.
- Lægen kan have givet dig Creon 40.000 til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CREON 40.000

Tag ikke Creon 40.000

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for pancreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er allergisk over for svineprotein eller andre svineprodukter.
- hvis du har akut betændelse i bugspytkirtlen.
- hvis du har akut forværring af kronisk lidelse i bugspytkirtlen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Creon 40.000

Tal med lægen, inden du tager Creon 40.000, hvis du

- har svær forstoppelse,
- tarmen ikke fungerer, eller

- du har betændelse i tarmen.

Hvis du har cystisk fibrose, må du kun tage Creon 40.000 efter lægens anvisning.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Creon 40.000 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Creon 40.000 sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Creon 40.000 efter aftale med lægen.

Amning:

Du kan tage Creon 40.000, selvom du ammer.

Trafik og arbejdssikkerhed

Creon 40.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CREON 40.000

Hvis din læge har ordineret Creon 40.000 til dig, skal du altid følge lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 enterokapsl til de 3 hovedmåltider.

Behandlingen starter med lav dosis og bliver derefter justeret til dit behov. Du må kun ændre din dosis i samråd med lægen.

Børn:

Du må kun bruge Creon 40.000 til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Du kan synke kapslerne hele, eller du kan åbne dem og bruge granulatet som drys på f.eks. ymer. Det er vigtigt at indtage granulatet STRAKS efter at du har blandet det. Granulatet må IKKE tygges.

Indtag altid rigelig væske (2–3 liter) hver dag i de perioder, hvor du bruger Creon 40.000.

Hvis du har taget for mange Creon 40.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon 40.000, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Det gælder især for børn.

Hvis du har glemt at tage Creon 40.000

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Creon 40.000

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Creon 40.000 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

- **Meget sjældne bivirkninger**
(det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
Bindevævsforandringer i tyktarmen. Forsnævring af tyktarmen og blod i afføringen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- **Almindelige bivirkninger**
(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Mavesmerter.
- **Ikke almindelige bivirkninger**
(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
Diaré, kvalme, forstoppelse, opkastning, unormal afføring og udslæt.
- **Hypigheden ikke kendt:**
Vægttab, irritation ved endetarmen og luft i maven.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. SÅDAN OPBEVARER DU CREON 40.000

Opbevar Creon 40.000 utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Creon 40.000 ved temperaturer over 30 °C og efter åbning af beholderen ikke over 25 °C.

Brug ikke kapslerne, hvis de viser tydelige tegn på nedbrydning.

Brug ikke Creon 40.000 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Efter åbning af beholderen er holdbarheden 3 måneder.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Creon 40.000 hårde enterokapsler indeholder:

Aktivt stof: pankreatin svarende til

Amylase 25.000 EP-enheder

Lipase 40.000 EP-enheder

Protease 1.600 EP-enheder

Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000; hypromellosephthalat; cetylalkohol; triethylcitrat; dimeticon; gelatine; gul og rød jernoxid (E172); titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat.

Creon 40.000 er sukker- og lactosefri.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Creon 40.000 er brune/klare kapsler.

Pakningsstørrelse

Tabletbeholder af plast med skruelåg: 100 stk

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Abbott Products GmbH · Hans-Böckler-Allee 20 · D-30173 Hannover · Tyskland

Repræsentant for Danmark:

Abbott Products ApS · Hørkær 28 · DK-2730 Herlev

Tlf: 44 92 22 18 · Fax: 44 92 22 19

Fremstiller:

Abbott Products GmbH · Justus-von-Liebig-Strasse 33 · D-31535 Neustadt · Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2010