

Ubehandlet kan for lav blodglukose have dødelig udgang.

Symptomerne forsvinder som regel efter indtagelse af kulhydrater (sukker, brød og lign.). Kunstige sødemidler har ingen effekt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

- Almen sløvhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
- Gulsot med hudkløe. Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

- Mavegener, bl.a. mavesmerte, kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, diaré eller forstoppelse. De kan undgå eller formindske disse bivirkninger ved at tage Uni Diamicon® i forbindelse med morgenmåltidet.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

- Blærer på huden. Udslet, kløe, nældefeber. Diffus rødme af huden. Pletvise udslet med små blærer.
- Forbigående synsforstyrrelser. Forekommer hyppigst i begyndelsen af behandlingen på grund af ændring i blodglukoseniveauet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5. SÅDAN OPBEVARER DE UNI DIAMICRON®

Opbevar Uni Diamicon® utilgængeligt for børn.

Opbevar Uni Diamicon® i originalemballagen.

Brug ikke Uni Diamicon® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Uni Diamicon® 30 mg, tabletter med modificeret udløsning indeholder:

- Aktivt indholdsstof: Gliclazid.
- Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, maltodextrin, hypromellose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Uni Diamicon® 30 mg er en hvid, aflang tablet præget "DIA 30" på den ene side og  på den anden side.

Pakningsstørrelser

28, 56, 84 og 168 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A, 2730 Herlev.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2007

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Uni Diamicon® 30 mg

tabletter med modificeret udløsning

Gliclazid

P620017-B

Uni Diamicon® svarer til Diamicon® Uno

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Uni Diamicon® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Uni Diamicon® og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Uni Diamicon®
3. Sådan skal De tage Uni Diamicon®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Uni Diamicon®
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNINGEN AF UNI DIAMICRON® OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

- Uni Diamicon® er et antidiabetikum. Det hører til gruppen af sulfonylurinstoffer.
- Uni Diamicon® sænker blodets indhold af glukose ved at stimulere udskillelsen af insulin i bugspytkirtlen.
- De kan bruge Uni Diamicon® til behandling af diabetes, der ikke kræver insulin (type 2-diabetes), når kostomlægning, motion og vægttab ikke er tilstrækkeligt til at opnå en tilfredsstillende blodglukose.
- Uni Diamicon® har en længere virkning end almindelige tabletter (modificeret udløsning).

Lægen kan have givet Dem Uni Diamicon® til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE UNI DIAMICRON®

Tag ikke Uni Diamicon® hvis De

- er overfølsom over for gliclazid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- er overfølsom over for anden medicin af samme type som gliclazid (sulfonylurinstoffer).
- er overfølsom over for antibiotika til behandling af blærebetændelse (sulfonamider).
- har insulinkrævende diabetes (type 1-diabetes).
- har syre (ketonstoffer) i blod eller urin eller syreforgiftning med uklarhed.
- har en alvorlig nyre- eller leversygdom.
- er i behandling for svampeinfektioner med miconazol (se afsnittet "Brug af anden medicin").
- ammer (se afsnittet "Graviditet og amning").

Vær ekstra forsigtig med at tage Uni Diamicon®

Tal med lægen, inden De tager Uni Diamicon®, hvis

- Deres lever eller nyrer fungerer dårligt.
- De har nedsat stofskifte.
- Deres hypofyse eller binyrebark danner for lidt hormon.

For lav blodglukose

Det er vigtigt, at De spiser regelmæssigt (også morgenmad). Risikoen for for lav blodglukose bliver større, hvis De

- spiser uregelmæssigt eller for lidt, eller hvis De ændrer på Deres kost.
- arbejder hårdt fysisk eller dyrker meget motion og ikke spiser i forhold til dette.
- drikker alkohol.
- får anden medicin, der også sænker Deres blodglukose.

Det er derfor meget vigtigt, at De spiser regelmæssigt og rigtigt og måler Deres blodglukose regelmæssigt.

Symptomer på for lav blodglukose er omtalt i afsnittet om bivirkninger.

Hvis De har for lav blodglukose, skal De have noget at spise, gerne brød eller andet, der virker i længere tid på blodglukosen. Druesukker har kun en kortvarig virkning, og kunstige sødemidler har ingen virkning. De skal være opmærksom på, at der kan gå flere dage, før virkningen af Uni Diamicon® er væk. Tal med Deres læge.

Deres blodglukose kan stige, hvis De

- får en infektion (f.eks. halsbetændelse, lungebetændelse, blærebetændelse) med feber.
- er kommet alvorligt til skade.
- skal opereres.

Nogle gange kan det være nødvendigt at give insulin. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Forskellig medicin kan påvirke hinandens virkning, således at De muligvis skal have ændret dosis. Tal med lægen.

Nedenstående medicin kan øge risikoen for for lav blodglukose:

- Anden medicin mod diabetes.
- Medicin mod
 - svampeinfektioner (miconazol). De må ikke få miconazol, mens De tager Uni Diamicon®.
 - urinsyreigt (phenylbutazon).
 - dårligt hjerte eller forhøjet blodtryk (betablokkere (f.eks. atenolol, metoprolol) eller ACE-hæmmere (f.eks. enalapril, ramipril)).
 - svampeinfektioner (fluconazol).
 - for meget mavesyre (H₂-receptorantagonister f.eks. cimetidin, ranitidin).
 - depression (MAO-hæmmerne isocarboxazid og moclobemid).
 - Parkinsons sygdom (selegilin).
 - blærebetændelse (sulfonamider).
 - smertestillende medicin og gigtmicin (NSAID, f.eks. diclofenac, etodolac, ibuprofen, naproxen).
- Medicin, der indeholder alkohol (f.eks. hostesaft).

Nedenstående medicin kan give for høj blodglukose (hyperglykæmi):

- Medicin mod psykiske lidelser (chlorpromazin over 100 mg daglig).
- Binyrebarkhormoner (f.eks. betamethason, methylprednisolon, prednisolon).

Bemærk også at

- Uni Diamicon® kan forstærke virkningen af blodfortyndende medicin (warfarin).
- visse former for hjertemedicin (betablokkere) kan sløre symptomerne på for lav blodglukose.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Uni Diamicon® sammen med mad og drikke

- Det er bedst, hvis De tager Uni Diamicon® sammen med morgenmåltidet.
- De skal tage Uni Diamicon® med et glas vand.
- Tag ikke Uni Diamicon® sammen med drikkevarer, der indeholder alkohol.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Uni Diamicon®, hvis De er gravid eller ønsker at blive det. Hvis De forsøger at blive gravid, eller hvis De opdager, at De er gravid, skal De kontakte Deres læge, da De skal have behandlingen ændret.

Amning

De må ikke amme, hvis De får Uni Diamicon®. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Uni Diamicon® kan give hypoglykæmi, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGET UNI DIAMICRON®

Tag altid Uni Diamicon® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Startdosis er 1 tablet daglig. Hvis denne dosis ikke giver et tilfredsstillende blodglukoseniveau, kan lægen øge dosis trinvis til 2, 3 eller 4 tabletter daglig. Følg lægens anvisninger.

De skal tage tabletterne hele. De må ikke knuse eller tygge dem.

Ældre (over 65 år)

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Hvis Deres nyrefunktion er let til moderat nedsat, er det normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med Lægen.

Børn

De må ikke bruge Uni Diamicon® til børn.

Hvis De har taget for mange Uni Diamicon®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Uni Diamicon®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Der vil være risiko for, at Deres blodglukose er blevet for lav. Symptomer på for lav blodglukose står under bivirkninger. Mål Deres blodglukose, hvis det er muligt.

Hurtig behandling af for lav blodglukose er at spise sukker (4–6 stykker) eller slik eller drikke noget, der indeholder sukker. Virkningen er meget kortvarig. De skal derfor også spise rigtig mad, helst rigeligt med brød. Se også afsnittet "Vær ekstra forsigtig med at tage Uni Diamicon®".

De skal fortælle Deres familie, venner og arbejdskammerater, at De har diabetes, og at de straks skal tilkalde en ambulance (ring 112), hvis De bliver bevidstløs.

Hvis De har glemt at tage Uni Diamicon®

Hvis De har glemt en dosis, så tag den, så snart De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Uni Diamicon®

De må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Fortæl det straks til lægen, hvis De igen føler Dem syg, efter behandlingen med Uni Diamicon® er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Uni Diamicon® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

For lav blodglukose

Behandling med Uni Diamicon® kan give for lav blodglukose. Det kommer hyppigt, hvis De spiser uregelmæssigt og især, hvis De springer måltider over.

Symptomer på for lav blodglukose kan være:

- Kraftig sult, sved, rysten på hænderne, hurtig puls.
- Hovedpine, træthed, ængstelse. Sløvhed, søvnforstyrrelse.
- Ophidselse, aggressivitet. Koncentrationsbesvær, manglende opmærksomhed og nedsat reaktionsevne, konfusion. Depression.
- Tale- og synsforstyrrelser.
- Brystsmerter.
- Lammelser, føleforstyrrelser. Svimmelhed. Kraftsløshed, kramper.
- Sløvhed og bevidsthedstab.