

Indlægsseddel: Information til brugeren

Seropram[®] 30 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at tage Seropram[®]
- Sådan skal du tage Seropram[®]
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Seropram[®] er et lægemiddel mod depression og panikangst. Det tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes selektive serotoninenoptagshæmmere (SSRI). Seropram[®] øger mængden af et vigtigt stof (serotonin) i hjernen. Lavt indhold af dette stof er en af årsagerne til udvikling af de fleste typer depression og relaterede sygdomme.

Du kan få Seropram[®] til:

- behandling af moderat til svær depression
- forebyggelse af tilbagevendende depression
- behandling af panikangst.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Seropram[®]

Tag ikke Seropram[®]

- hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Seropram[®] (angivet i pkt. 6).
- hvis du tager pimozid (medicin mod sindslidelser)
- hvis du tager en type medicin kaldet MAO-hæmmere, som også bruges til behandling af depression samt andre sygdomme, f.eks. Parkinsons sygdom
- hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).
- hvis du tager medicin mod et hjerterytme problem eller medicin der kan påvirke hjerterytmen.

Se også afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Seropram[®]" nedenfor.

Du må først tage Seropram[®] 2 uger efter, du er stoppet med at tage en MAO-hæmmer. Dog kan du begynde behandlingen med Seropram[®] et døgn efter, du er stoppet med at tage moclobemid. Efter at du er stoppet med at tage Seropram[®], skal der gå 1 uge, før du tager MAO-hæmmere. Din læge vil afgøre, hvor længe du skal vente, afhængigt af hvilken medicin du har taget.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Seropram[®]:

- hvis du har selvmordstanker eller har tanker om at gøre skade på dig selv.
- hvis du har nedsat leverfunktion.
- hvis du har nedsat nyrefunktion.
- hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald.
- hvis du har sukkersyge, da Seropram[®] kan påvirke dit blodsukker. Du bør måle dit blodsukker hyppigt og evt. tale med lægen om ændret behandling.
- hvis du lider af mani eller har haft mani.
- hvis du let kommer til at bløde eller tidligere har haft blødningsforstyrrelser (blødning fra hud eller slimhinder samt mave, tarm eller livmoder).
- hvis du tager medicin, der påvirker blodets evne til at størkne (f.eks. acetylsalicylsyre og warfarin).
- hvis du tager naturmedicin, som indeholder perikon (Hypericum perforatum).
- hvis du får elektrochokbehandling (ECT).
- hvis du har nedsat natriumindhold i blodet – det gælder især ældre i behandling med vanddrivende medicin.
- hvis du har tendens til nogle særlige rytmeforstyrrelser i hjertet (forlængelse af QT-intervallet).
- hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.
- hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
- hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjerтеbanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.
- hvis du er ældre.

Børn og teenagere:

Seropram[®] bør ikke anvendes til børn og teenagere under 18 år, medmindre lægen skønner, det er nødvendigt.

Kontakt lægen, hvis:

- Du får feber, muskelstivhed, rykvisе muskelsammentrækninger, rysten, forvirring, irritation, lyselig opstemthed og rastløs uro. Tilstanden kaldes serotoninergt syndrom og er sjælden, men den kan være livsfarlig. Kontakt derfor straks læge eller skadestue.
- Du får en manisk episode (sygelig opstemthed og uro).
- Du bliver rastløs på en ubehagelig måde i de første uger af behandlingen.
- Du får kramper eller din epilepsi bliver værre.

Du bør være opmærksom på følgende:

- Hvis du er under 18 år, har du en øget risiko for bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed f.eks. i form af truende eller voldelig adfærd, trodsighed samt vrede, hvis du tager Seropram[®], eller anden medicin af samme type (SSRI). Lægen vurderer, hvilken behandling, der er den bedste for dig.
- Hvis du bliver behandlet for panikangst, kan du muligvis opleve øget angst i starten af behandlingen. Dette aftager normalt ved fortsat behandling i løbet af et par uger.
- Du bør undgå at drikke alkohol, når du tager Seropram[®].
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Seropram[®]. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

- Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
- Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

Brug af anden medicin sammen med Seropram[®]

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

TAG IKKE Seropram[®] hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazin derivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erytromycin IV, pentamidin, malaria behandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Brug af Seropram[®] sammen med følgende medicin kan give alvorlige bivirkninger:

- Medicin mod sindslidelser (pimozid). Du må ikke tage Seropram[®] sammen med pimozid (se afsnittet "Tag ikke Seropram[®]" ovenfor).
- Medicin mod depression (isocarboxazid eller moclobemid). Du må ikke tage Seropram[®] sammen med isocarboxazid eller moclobemid (se afsnittet "Tag ikke Seropram[®]" ovenfor).
- Medicin mod Parkinsons sygdom (selegilin). Du må ikke tage mere end 10 mg selegilin dagligt (se afsnittet "Tag ikke Seropram[®]" ovenfor).
- Medicin mod nogle infektioner (linezolid) (se afsnittet "Tag ikke Seropram[®]" ovenfor).

Tal med din læge, hvis du tager:

- Medicin mod mani og depression (lithium).
- Visse proteindrikke mod nedsat appetit eller kosttilskud, som indeholder aminosyren tryptophan.
- Medicin mod migræne (f.eks. sumatriptan).
- Medicin mod stærke smerter (f.eks. tramadol).
- Medicin mod smerter/gigtmedicin (acetylsalicylsyre, NSAID).
- Medicin til rygeafvænnning (bupropion).
- Medicin mod malaria (mefloquin).
- Medicin mod for meget mavesyre og mavesår (f.eks. cimetidin). Virkningen og bivirkninger af Seropram[®] kan forstærkes.
- Naturlægemidler, som indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum). Der er øget risiko for bivirkninger ved samtidig brug af Seropram[®].
- Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin og dipyridamol), da der er en øget risiko for blødningsforstyrrelser.
- Hjertemedicin og medicin for blodtrykket (f.eks. flecainid, propafenon og metoprolol). Det kan være nødvendigt at justere dosis.
- Anden medicin mod depression (f.eks. clomipramin, imipramin, amitriptylin, nortriptylin, oxitriptan og tryptophan).
- Medicin mod sindslidelser (f.eks. risperidon, thionidazin, haloperidol).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Seropram[®], og Seropram[®] kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Seropram[®] sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Seropram[®] i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Seropram[®] øger ikke virkningen af alkohol. Du bør dog ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med Seropram[®].

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Seropram[®] efter aftale med lægen. Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, eller hvis du mener, at du er gravid.

Seropram[®] bør ikke anvendes i den sidste del af graviditeten, da det nyfødte barn kan risikere at få alvorlige bivirkninger eller abstinenser bl.a. åndenød, blåfarvning af hud og læber pga. iltmangel, uregelmæssig vejtrækning med vejtrækningspauser, krampeanfald, temperatursvingninger, madningsbesvær, opkastning, for lavt blodsukker, forøget muskelspænding, nedsat kraft i musklerne, øgede reflekser, rysten/skælven, nervøsitet, irritabilitet, søvnliggende sløvhedstilstand, vedvarende gråd, tilstand af bevidsthedssvækkelse eller meget dyb søvn, søvnbesvær. Hvis noget af dette sker, skal du straks kontakte din læge eller jordemoder. Fortæl jordemoderen og/eller lægen, at du tager Seropram[®]. Når medicin som Seropram[®] tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det øge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Amning

Seropram[®] går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Seropram[®] efter aftale med lægen.

Fertilitet

Seropram[®] har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Seropram[®] kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Seropram[®] indeholder laktose

Kontakt lægen, inden du begynder at tage Seropram[®], hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Seropram[®]

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Der er stor forskel på, hvor meget den enkelte patient skal tage. Det afhænger bl.a. af, hvor alvorlig din sygdom er. Det anbefales at starte behandlingen med en lavere dosis og øge dosis gradvist til den individuelle vedligeholdelsesdosis. Hvis den lavere dosis ikke kan opnås med dette produkt, findes der andre tilgængelige lægemidler, som indeholder citalopram.

Den sædvanlige dosis er:

Depression:

Voksne

Den sædvanlige startdosis er 20 mg dagligt. Den kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

Ældre patienter (over 65 år)

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt.

Panikangst:

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge inden dosis kan øges til 20-30 mg dagligt. Dosis kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

Børn og teenagere under 18 år

Seropram[®] bør normalt ikke anvendes til børn og teenagere under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Ved let til moderat nedsat nyrefunktion vil din læge ordinere den sædvanlige dosis. Ved alvorlig nedsat nyrefunktion bør der udvises forsigtighed og det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt.

Nedsat metabolisering via CYP2C19

Da lægemidlet omsættes af leverenzymet CYP2C19, anbefales en startdosis på 10 mg 1 gang dagligt i de første to uger af behandlingen til patienter, hvor denne funktion er nedsat. Din læge vil herefter øge dosis til 20 mg 1 gang dagligt, afhængigt af hvordan medicinen virker på dig.

Hvordan og hvornår skal Seropram[®] tages

Du skal tage Seropram[®] hver dag som en enkelt daglig dosis. Du kan tage Seropram[®] når som helst på dagen med eller uden mad. Synk tabletterne med et glas vand. Du må ikke tygge tabletterne.

Varighed af behandlingen

Som med andre lægemidler mod depression og panikangst kan der gå nogle uger, før du mærker en bedring. Den antidepressive effekt og effekten på panikangst sætter som regel ind efter 2-4 uger. Du må ikke ændre din dosis af Seropram[®] uden at have talt med lægen. Det er lægen, der afgør, i hvor lang tid du skal behandles. Det er normalt, at behandlingen varer i mindst 6 måneder. Fortsæt med at tage Seropram[®] i den periode, lægen har anbefalet. Hold ikke op med at tage Seropram[®], selv om du begynder at få det bedre, medmindre lægen anbefaler det. Selve sygdommen kan vare ved i lang tid, og hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage. Hvis lægen beslutter, at behandlingen skal ophøre, vil din dosis gradvist blive reduceret over mindst én til to uger for at nedsætte risikoen for, at du får bivirkninger.

Hvis du har tilbagevendende depressioner, kan du have gavn af at fortsætte behandlingen for at forebygge nye depressioner - somme tider i flere år.

Hvis du har taget for mange Seropram[®]

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Seropram[®], end der står her, eller mere, end lægen har foreskrevet og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosis af citalopram kan være:

- Kramper.
- Hurtig eller langsom puls.
- Alvorlige hjerterytm- og ledningsforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.
- For højt eller for lavt blodtryk.
- Hjertestop.
- Sløvhed (søvntrang).
- Koma.
- Kvalme og opkastning.
- Rastløs uro.
- Rysten.
- Feber, muskelstivhed, rykvisе muskelsammentrækninger, rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og rastløs uro (serotonergt syndrom).
- Svimmelhed.
- Store pupiller.
- Svedtendens.
- Fuldkommen sløvhedstilstand, som kan medføre bevidstløshed eller ubevægelighed.
- Blåfarvning af hud og slimhinder pga. iltmangel.
- Hurtig overfladisk vejtrækning (hyperventilation).

Hvis du har glemt at tage Seropram[®]

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Seropram[®]

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Seropram[®].

Brat afbrydelse af behandlingen kan give lettere og forbigående abstinenser som svimmelhed, prikken/snurren i huden, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst og uro, hovedpine, kvalme, opkastning, svedtendens, rysten, forvirring, følelsesmæssig uligevægtighed eller irritabilitet, diaré, synsforstyrrelser, hjertebanken.

Når du har gennemført den planlagte behandling, vil lægen derfor nedsætte din dosis af Seropram[®] gradvist i løbet af nogle uger. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. Kontakt straks lægen, hvis du føler dig syg, efter behandlingen med Seropram[®] er stoppet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer skal du stoppe med at tage Seropram[®] og kontakte din læge omgående:

- Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Kvalme og utilpashed med muskelsvækkelse, forvirring, koma og kramper. Det kan være tegn på for lavt indhold af natrium i blodet (vasopressinhypersekretion).
- Leverbetændelse.
- Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112.

Andre bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt.

- Forvirring, rysten, svedtendens, feber, hjertebanken, øgede reflekser (serotonergt syndrom).
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. for få blodplader i blodet. Kontakt lægen eller skadestuen.
- Blodig opkastning og /eller sort afføring pga. blødning i maven og tarm samt endetarmsblødning.
- Selvmordstanker, selvmordsadfærd.

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med citalopram eller kort efter behandlingsophør. Kontakt læge eller skadestue.

Følgende bivirkninger er sædvanligvis milde og forsvinder efter nogle få dages behandling. Vær opmærksom på, at flere af bivirkningerne nedenfor også kan være symptomer på din sygdom og vil aftage, når du begynder at få det bedre.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

- Hjertebanken, rysten, øget svedtendens.
- Sløvhed (søvntrang), kræftsløshed og svaghed.
- Rastløs uro, søvnløshed, nervøsitet.
- Svimmelhed.
- Nedsat evne til at se skarpt.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Seropram[®] i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
- Kvalme, forstoppelse.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Nedsat appetit, vægttab, øget appetit, smagsforstyrrelser.
- Diaré, opkastning, sure opstød/halsbrand, mavesmerter, luft i maven.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- For lavt blodtryk.
- Svimmelhed (evt. kun når du rejser dig) pga. lavt blodtryk.
- Prikken og snurren i huden.
- Træthed, søvnforstyrrelser.
- Migræne.
- Susen for ørerne (tinnitus).
- Synsforstyrrelser.
- Snue, bihulebetændelse (sinusitis), gaben.
- Feber.
- Vandladningsbesvær.
- Kløe, udslæt.
- Muskelsmerter, ledsmerter.
- Problemer med sædafgang, impotens (rejsningsbesvær).
- Menstruationssmerter.
- Nedsat seksuallyst.
- Unormale orgasmer hos kvinder.
- Angst, forvirring, ligegyldighed.
- Nedsat koncentrationsevne, hukommelsestab.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Utilpashed.
- Besvimelse.
- Kramper.
- Bevægelsesforstyrrelser.
- Store pupiller.
- Hoste.
- Vandladningsstop Det kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Nældefeber, væskeansamlinger, overfølsomhed.
- Øget følsomhed af huden for lys (fotosensibilitet).
- Mindre blødning i hud og slimhinder.
- Usædvanlig kraftig menstruationsblødning.
- Truende evt. voldelig adfærd, uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person.
- Opstemthed (mani, eufori).
- Forøget seksuallyst.
- Vægtøgning.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Ufrivillige bevægelser.
- Manglende evne til at sidde stille.
- Rukkende, vridende bevægelser især i benene.
- Blødning.
- Nedsat indhold af natrium i blodet.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Udslæt (nældefeber)og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarlig Ring 112.
- Udsivning af mælk fra brysterne.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt.

- Næseblod.
- Blødninger i huden.
- Uregelmæssig, kraftig blødning.
- Panikanfald.
- Tænderskæren.
- Bevægelsesforstyrrelser, rastløshed.
- Ændringer i hjerterytmen (QT-forlængelse), overvejende hos patienter, som i forvejen lider af en hjertesygdom.
- Unormale levertal.
- Nedsat indhold af kalium i blodet.

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Seropram[®] kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevar Seropram[®] utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Tag ikke Seropram[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletlet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Seropram[®] indeholder:

Aktivt stof: Citalopram (som hydrobromid). Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, laktosemonhydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, copovidon, glycerol 85%, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose 5, macrogol 400, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Seropram[®] 30 mg filmovertrukne tabletter er ovale og hvide med delekærv og mærket med "C" og "P".

Pakningsstørrelser

28 og 98 tabletter i blisterpakning. Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

A-Pharma ApS
Usserød Kongevej 32
2970 Hørsholm

Repræsentant, ompakket og frigivet af:

Copharma ApS
Kanalholmen 8-12
2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2012

Seropram[®] er et registreret varemærke, der tilhører H. Lundbeck A/S

Seropram[®] svarer til Cipramil[®]