

TAZOCIN[®]

Pulver til injektionsvæske og infusionsvæske, opløsning 2 g/0,25 g resp. 4 g/0,5 g

BRUGSVEJLEDNING

DEKLARATION

1 hætteglas indeholder:

Piperacillin. natr. respond. piperacillin. 2 g resp. 4 g,
tazobactam. natr. respond. tazobactam 0,25 g resp. 0,5 g.

Hjælpestoffer: Dinatriumedetat (dihydreret) (EDTA)
Citronsyremonohydrat

TILBEREDNING AF OPLØSNING

Intravenøs injektion:

TAZOCIN 2 g/0,25 g resp. 4 g/0,5 g opløses i mindst 10 ml resp. 20 ml egnet infusionsopløsning (se nedenfor). Omrystes indtil alt pulver er opløst. Opløsningen injiceres intravenøst. (3-5 minutter).

Intravenøs infusion:

TAZOCIN 2 g/0,25 g resp. 4 g/0,5 g opløses i mindst 10 ml resp. 20 ml egnet infusionsopløsning (se nedenfor). Omrystes indtil alt pulver er opløst. Opløsningen fortyndes siden yderligere til det ønskede volumen (eller mindst 50 ml) og infunderes kontinuerligt i løbet af 20-30 minutter.

BLANDBARHED

TAZOCIN pulver til injektionsvæske og infusionsvæske er blandbar med følgende injektions-/infusionsopløsninger:

VAND TIL INJEKTIONSVÆSKER (STERILT VAND)

NATRIUMKLORID 9 mg/ml

GLUKOSE 50 mg/ml

GLUKOSE 50 mg/ml MED NATRIUMKLORID

MACRODEX 60 mg/ml MED NATRIUMKLORID

RINGER-LAKTAT opløsning

RINGER-ACETAT opløsning

RINGER-ACETAT/MALAT opløsning (RINGERFUNDIN).

TAZOCIN må ikke blandes med andre antibiotika i samme infusionsopløsning. På grund af kemisk instabilitet bør Tazocin ikke anvendes sammen med opløsninger indeholdende udelukkende natriumbikarbonat. Tazocin bør ikke tilsættes til blodprodukter eller albuminhydrolysat.

Samtidig administration af Tazocin og aminoglykosider

Tazocin indeholdende EDTA er kun forligeligt til samtidig administration via Y-rørinfusion med nedenstående aminoglykosider og under nedenstående forhold:

Aminoglykosid	Piperacillin/ tazobactam dosis	Piperacillin/ tazobactam fortyndingsmængde (ml)	Aminoglykosid koncentrations- område (mg/ml)	Acceptable fortyndere
Amikacin	2g/0,25g 4g/0,5g	50, 100 eller 150	1,75 – 7,5	Natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml
Gentamicin	2g/0,25g 4g/0,5g	100 eller 150	0,7 – 3,32	Natriumklorid 9 mg/ml

Tazocins forligelighed med andre aminoglykosider er ikke fastlagt. Samtidig administration via Y-rør på anden måde end angivet oven for kan muligvis føre til, at aminoglykosiden gøres uvirksom.

INSTRUKTION VEDRØRENDE OPLØSNING AF TAZOCIN

- Anvend en almindelig optrækskanyle (rosa, 1,2 x 50 mm) og en sprøjte på mindst 20 ml (anvend en 20 ml sprøjte til 2 g/0,25 g og 30 ml til 4 g/0,5 g).
- Sæt kanylen på den tomme sprøjte.
- Fyld sprøjten med 10 ml opløsningsmiddel (til 2 g/0,25 g) eller 20 ml (til 4 g/0,5 g).
- Stik kanylen ind i hætteglassets gummiprop og tilsæt opløsningsmidlet. Omrystes indtil alt pulver er opløst. Opløsningen skal være klar og uden synlige partikler.
- Opløsningen kan derefter gives som intravenøs injektion eller fortyndes yderligere med passende opløsningsmiddel og gives som intravenøs infusion.

HOLDBARHED OG OPBEVARING

Den kemiske og fysiske stabilitet for færdige opløsninger er påvist at være 24 timer ved 25°C og 7 dage ved 2 til 8°C.

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal produktet anvendes umiddelbart. Hvis det ikke bruges straks, er opbevaringstiden og opbevaringsforholdene før anvendelse brugerens ansvar. Opbevaringstid og opbevaringsforhold før anvendelse bør dog ikke overstige 24 timer ved 2 til 8°C.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

6. marts 2009