

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Telfast® 180 mg filmovertrukne tabletter er ferskenfarvede aflange tabletter mærket "018" på den ene side og et præg på den anden side.

Pakningsstørrelser

Telfast® 180 mg filmovertrukne tabletter findes i 30 stk. og 105 stk. pakkede i blister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ompakket og frigivet af

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Telfast® er et registreret varemærke, der tilhører Sanofi-Aventis.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2010

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Telfast® 180 mg filmovertrukne tabletter fexofenadinhydrochlorid

P620115-A

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Telfast® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Telfast®
3. Sådan skal De tage Telfast®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Telfast® er et antihistamin, som virker ved at lindre overfølsomhedsreaktioner. Telfast® anvendes til at lindre symptomer på nældefeber.

Lægen kan have givet Dem Telfast® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE TELFAST®

Tag ikke Telfast®

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for fexofenadin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Telfast®

Tal med lægen, inden De tager Telfast®, hvis De

- har nedsat nyrefunktion
- har nedsat leverfunktion
- tidligere har haft eller har en hjertesygdom. Telfast® kan som andre antihistaminer give bivirkninger i form af hurtig puls og hjertebanken.

Ældre bør rådføre sig med lægen før de tager Telfast®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med Deres læge, hvis De tager medicin mod

- infektion (erythromycin)
- svamp (ketoconazol)
- for meget mavesyre, der indeholder aluminium- eller magnesiumhydroxid. Disse lægemidler kan reducere virkningen af Telfast®, og skal derfor tages med mindst 2 timers mellemrum.



P 620115(A)

1003

Brug af Telfast® sammen med mad og drikke

Det anbefales at tage Telfast® før et måltid.

De skal tage Telfast® med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Telfast®, hvis De er gravid.

Amning

De må ikke tage Telfast®, hvis De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Telfast® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE TELFAST®

Tag altid Telfast® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (180 mg) daglig før et måltid.

Ældre

- Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn under 12 år

- Børn må normalt ikke få Telfast® 180 mg, filmovertrukne tabletter.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis De har taget for mange Telfast®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Telfast®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er svimmelhed, døsighed, træthed og mundtørhed.

Hvis De har glemt at tage Telfast®

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Telfast®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Telfast® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede (0,1-1 %).

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede (0,01-0,1 %).

- Overfølsomhedsreaktioner som kan vise sig ved udslæt og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt (angioødem). Ring 112.
- Trykken for brystet
- Åndenød
- Rødmen
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede (1-10 %).

- Hovedpine
- Døsighed
- Kvalme
- Svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede (0,1-1 %).

- Træthed
- Søvnløshed
- Nervøsitet
- Søvnforstyrrelser
- Morbide drømme
- Hjertebanken
- Diarré.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede (0,01-0,1 %).

- Nældefeber
- Kløe
- Udslæt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

De kan opbevare Telfast® ved almindelig temperatur.

Tag ikke Telfast® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Telfast®, 180 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: fexofenadin 168 mg (svarende til fexofenadinhydrochlorid 180 mg).
- Øvrige indholdsstoffer: mikrokrySTALLinsk cellulose, prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, magnesium stearat, hypromellose, povidon, titandioxid (E 171), kolloid vandfri silica, macrogol 400 og gul og rød jernoxid (E 172).