

CANAURAL[®]**Øredråber, suspension til hund**

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: Genera Inc., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Kroatien

Repræsentant: Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark

Veterinærlægemidlets navn: Canaural øredråber, suspension til hund

Angivelse af de aktive stoffer og andre indholdsstoffer:

1 g suspension indeholder:

Virksomme stoffer:

Diethanolamininfusidat 5,0 mg

Framycetinsulfat 5,0 mg

Nystatin 100.000 IE

Prednisolon 2,5 mg

Hjælpestoffer:

Sesamolie

Gullig oliesuspension.

Indikationer: Canaural øredråber anvendes ved betændelse i den ydre øregang (Otitis externa) hos hund.

Canaural er et kombinationspræparat med bakteriedræbende og betændelseshæmmende virkning, og produktet er samtidig effektivt ved svampe- og mideinfektioner. Det har også en kløestillende effekt.

Kontraindikationer:

- Canaural øredråber må ikke anvendes ved perforeret trommehinde.

- Canaural øredråber bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller hjælpestoffet.

Bivirkninger: Overfølsomhed overfor et af indholdsstofferne kan forekomme.

Brugen af præparater i det ydre øre kan forårsage nedsat hørelse, primært i ældre hunde. Hvis dette iagttages, skal behandlingen afbrydes.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Dyrearter: Hund.

Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej: Til anvendelse i øret.

Før behandling anbefales det at rense og tørre den ydre øregang med et stykke rent vat eller lignende. Endvidere bør eventuel overskydende hårvækst omkring behandlingsområdet fjernes.


Flasken skal **OMRYSTES** før brug.

5-10 dråber dryppes i øregangen 2 gange dagligt i 10-14 dage.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Oplysninger om korrekt anvendelse:



- Efter inddrypning bør øret masseres forsigtigt for at opnå en god fordeling af dråberne i øregangen.

- Vask hænderne efter brug.

Tilbageholdelsestid: Ikke relevant.

Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring:

- Opbevares utilgængeligt for børn.

- Må ikke opbevares over 25°C.

- Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen, EXP.

Særlige advarsler:

- Kun til udvendigt brug.

- Grundet indhold af binyrebarkhormon skal dosering i mellemlange til lange perioder generelt undgås.

- Hvor der er tale om en øremide infektion skal det overvejes at behandle begge ører, selvom infektionen kun er til stede i det ene øre.

- Inden lægemidlet inddryppes skal den ydre øregang omhyggeligt gennemses for at sikre at trommehinden ikke er sprængt og dermed undgå risikoen for at overføre infektionen til mellemøret og forebygge skader på det indre øre.

- Betændelse i øregangen forårsaget af bakterier og svampe er ofte af sekundær natur. Den tilgrundliggende årsag bør derfor diagnosticeres og behandles.

- Efter behandlingen skal ørene checkes med jævnlige intervaller for symptomer på reinfektion.

- Sikkerheden af Canaural øredråber under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.

- Personer med kendt overfølsomhed overfor indholdsstofferne skal undgå kontakt med lægemidlet.

- Undgå hudkontakt. I tilfælde af utilsigtet eksponering skylles med rigelige mængder vand.

- Brug af lægemidlet bør baseres på identifikation af de inficerede organismer og resistensbestemmelse samt tage højde for officielle lokale antibiotikapolitikker. Brug af dette lægemiddel, der afviger fra instruktionerne i produktresuméet kan føre til øget forekomst af bakterier, der er resistente overfor fusidinsyre eller framycetin sulfat.

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra

sådanne: Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

Dato for seneste revision af indlægssedlen: 03/2019

Andre oplysninger: Plastflaske med dråbespids.

Pakningsstørrelser: 1x15 ml, 1x25 ml, 10x25 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis de ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.