

Zyvoxid® 600 mg, filmovertrukne tabletter

Linezolid

L90075A-01

Zyvoxid® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Caribe Limited

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Zyvoxid til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zyvoxid
3. Sådan skal De tage Zyvoxid
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zyvoxid er et antibiotikum, der bruges til behandling af betændelse, der skyldes bestemte bakterier.

Det kan være lungebetændelse og infektioner i huden og under huden. Deres læge har vurderet at Deres infektion kan behandles med Zyvoxid.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zyvoxid

De må ikke tage Zyvoxid, hvis De

- er overfølsom over for linezolid eller et af de øvrige indholdsstoffer
- inden for de seneste 2 uger, har taget medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid)
- tager medicin mod depression (f. eks. citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin)
- ammer, fordi Zyvoxid udskilles i modermælken og kan påvirke barnet

Fortæl det til lægen, hvis noget af det, der står herunder, gælder for dem.

Måske er Zyvoxid ikke den rigtige behandling for Dem. Lægen vil undersøge Dem og måle blodtrykket før og under behandlingen. Det er muligt, at De skal have en anden behandling end Zyvoxid. Hvis De er i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

- for højt blodtryk.
- for højt stofskifte.
- godartede hormondannende knuder i binyremarven (fæokromocytom) eller andre hormondannende knuder, med symptomer som diarré, blussende hud, hvæsende vejtrækning.
- psykiske lidelser f.eks. mani, skizofreni, forvirring eller andre psykiske problemer.

- De bruger nogle af følgende typer medicin:
 - o medicin mod forkølelse og tilstoppet næse, som indeholder pseudoefedrin eller fenypropamolamin.
 - o medicin mod astma, f.eks. salbutamol, terbutalin eller feneterol.
 - o medicin mod depression, f.eks. amitriptylin, citalopram, clomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin.
 - o medicin mod migræne f.eks. sumatriptan og zolmitriptan.
 - o medicin mod pludselige, alvorlige allergiske reaktioner, f.eks. adrenalin.
 - o medicin som får blodtrykket til at stige f.eks. noradrenalin, dopamin og dobutamin.
 - o medicin mod moderate til stærke smerter, f.eks. pethidin.
 - o beroligende medicin mod angst, f.eks. buspiron.

Tal med lægen, inden De får Zyvoxid, hvis De

- let får blå mærker eller blødninger.
- har blodmangel.
- let får infektioner eller betændelse.
- har haft krampeanfald.
- har problemer med leveren eller nyrerne, især hvis De får dialyse.
- har diarré.

Kontakt straks læge, hvis De får:

- problemer med synet f.eks. sløret syn, ændringer i farvesynet, problemer med at se detaljer eller, hvis Deres synsfelt bliver mindre.
- diarré, især blodig diarré. Det kan være tegn på tarmbetændelse, som kan opstå ved behandling med antibiotika. Det kan blive nødvendigt at afbryde behandlingen.
- tilbagevendende kvalme eller opkastning, mavesmerter eller ufrivilligt hurtig eller dyb vejtrækning.

Brug af anden medicin

Zyvoxid kan måske reagere sammen med anden medicin og give bivirkninger så som påvirkning af blodtrykket, temperaturreguleringen eller pulsen.

Fortæl det altid til lægen, hvis De bruger eller har brugt følgende medicin indenfor de sidste 2 uger.

De må ikke bruge de nævnte typer medicin samtidig med Zyvoxid. (se også pkt 2. "Det skal De vide om Zyvoxid").

- medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid).
- tager medicin mod depression (f. eks. citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin)

Fortæl det også til lægen, hvis De bruger noget af nedenstående medicin. Måske er Zyvoxid stadig den rigtige behandling for Dem, men lægen vil undersøge Dem og måle blodtrykket før og under behandlingen. Det er også muligt, at De skal have en anden behandling end Zyvoxid.

- medicin mod forkølelse og tilstoppet næse, som indeholder pseudoefedrin eller fenypropamolamin.

- medicin mod astma, f.eks. salbutamol, terbutalin eller feneterol.
- visse typer medicin mod depression, f.eks. amitriptylin, citalopram, clomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin.
- medicin mod migræne f.eks. sumatriptan og zolmitriptan.
- medicin mod pludselige alvorlige, allergiske reaktioner, f.eks. adrenalin.
- medicin som får blodtrykket til at stige f.eks. noradrenalin, dopamin og dobutamin.
- medicin mod moderate til stærke smerter, f.eks. pethidin.
- beroligende medicin mod angst, f.eks. buspiron.
- blodfortyndende medicin f.eks. warfarin.
- medicin mod infektion f.eks. rifampicin.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Zyvoxid sammen med mad og drikke

- De kan tage Zyvoxid før, under eller efter et måltid.
- De bør kun indtage små mængder gammel/moden ost, gærkekstrakter og gærede sojabønneprodukter, såsom sojasauce, og De bør undgå alkohol, især øl og vin. Det skyldes, at Zyvoxid sammen med tyramin, som findes i denne type madvarer, kan få Deres blodtryk til at stige.
- Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis De får dunkende hovedpine efter at have spist og drukket.

Graviditet og amning

Det vides ikke, hvordan Zyvoxid påvirker graviditeten. Derfor vil De normalt ikke blive behandlet med Zyvoxid, hvis De er gravid. Lægen vil vurdere det i hvert enkelt tilfælde. Hvis De er gravid, tror at De er gravid eller ønsker at blive gravid, skal De fortælle det til lægen.

De må ikke amme, mens De får Zyvoxid. Det skyldes at Zyvoxid udskilles i modermælken og kan påvirke barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zyvoxid kan gøre Dem svimmel. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Husk at Deres evne til at betjene maskiner eller køre bil kan være påvirket, hvis De føler dem dårlig.

3. Sådan skal De tage Zyvoxid

Tag altid Zyvoxid nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

1 tablet (600 mg) 2 gange dagligt (hver 12. time).

Tabletten skal synkes hel med et glas vand.

Hvis De går i dialyse, bør De tage Zyvoxid efter dialysen.

Kuren varer normalt 10 - 14 dage. Risiko og virkning ved behandling i mere end 28 dage kendes ikke. Lægen bestemmer, hvor længe De skal behandles.

Under behandlingen med Zyvoxid vil lægen tage blodprøver for at kontrollere blodtallene. Hvis behandlingen strækker sig over mere end 28 dage skal lægen kontrollere Deres syn.

Børn:

Zyvoxid bruges normalt ikke til behandling af børn og unge under 18 år.

Hvis De har taget for mange Zyvoxid filmovertrukne tabletter

Kontakt straks lægen eller apoteket, hvis De tror, at De har taget for mange Zyvoxid tabletter.

Hvis De har glemt at tage Zyvoxid filmovertrukne tabletter

Hvis De glemmer at tage en tablet, skal De tage den straks, De kommer i tanke om den. Tag næste tablet 12 timer efter denne og fortsæt med at tage tabletterne hver 12 time. De må ikke tage to tabletter samtidig.

Hvis De holder op med at tage Zyvoxid filmovertrukne tabletter

Det er vigtigt, at De fortsætter behandlingen, medmindre lægen beder Dem stoppe. Fortæl det straks til lægen, hvis symptomerne kommer igen efter endt behandling. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. Bivirkninger

Zyvoxid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får dem.

Fortæl det straks til lægen, hvis de oplever bivirkninger, som dem der er nævnt herunder:

Alvorlige bivirkninger

Ikke-almindelige bivirkninger:

(Det sker for mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)

- Sløret syn, synsnedsettelse.

Kontakt øjnlæge via hospital

Hyppighed ikke kendt:

- Forvirring
- Rastløshed
- Rysten
- Hyperrefleksi
- Kramper
- Nedsat koordinationsevne
- Rødme
- Svedtendens og feber

Der er tale om serotonin syndrom, hvis flere af ovenstående symptomer optræder på samme tid.

- Sløret syn og synsnedsettelse og øjensmerter (betændelse i synsnerven)
- Hævelse af læber, mund, hals og svælg med aflukning af luftveje til følge (anafylaksi og/eller angioødem)
- Svært udslæt med blæredannelse på hud og slimhinder og feber (Steven Johnson Syndrom)
- Alvorlig mave og tarmlidelse med smerter, svære diarrer og slimdannelse (pseudomembranøs colitis).

Ring 112

Ikke-almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

(Det sker for mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Kuldegysninger
- Træthed
- Feber, tørst
- Lokale smerter ved indstikstedet
- Mundsvamp, skedesvamp, betændelse i genitalområdet
- Hovedpine
- Smagsforstyrrelse (metalsmag)
- Diarré, kvalme, opkastning
- Blodtryksforhøjelse
- Årebetændelse
- Forhøjede levertal (ALAT, ASAT), forhøjet kreatinin og mikroalbumin.

Kontakt lægen

Ikke-almindelige bivirkninger:

(Det sker for mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)

- Fald i hvide blodlegemer, fald i blodplader
- Søvnløshed, svimmelhed
- Føleforstyrrelser herunder nedsat hudfølsomhed, susen og ringning for ørerne
- Forstoppelse, fordøjelsesbesvær og ubehag evt. med mavesmerter
- Mund- og halsbetændelse
- Nældefeber, svedtendens, hudkløe og udslæt
- Hyppig vandladning
- Mundtørhed, misfarvning og betændelse i tungen.

Kontakt hospital eller læge

Hyppighed ikke kendt:

- Mælkesyreophobning i blodet
- Nedsat antal hvide blodlegemer
- Blodmangel
- Misfarvning af tænder
- Forhøjet bilirubin i blodet.

Kontakt lægen

Hvis De får alvorlige bivirkninger skal De straks kontakte lægen eller apoteket.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke Zyvoxid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Zyvoxid 600 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

- Linezolid
- Øvrige indholdsstoffer:
- Tabletterne: Mikrokrystallinsk cellulose (E460), majsstivelse, natriumstivelsesglycolat (type A), hydroxypropylcellulose (E463), magnesiumstearat (E572).
- Filmovertræk: Macrogol 400, hypromellose (E464), titandioxid (E171), carnaubavoks (E903).
Trykkeblæk: Rød jernoxid (E172)

Pakningsstørrelser

Zyvoxid findes i blisterkort med 10 tabletter i en karton.

Hver karton indeholder enten 10, 20, 30, 50 eller 60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

Abacus Medicine ApS
Vesterbrogade 149, DK-1620 København V.
Tel: +45 70 22 02 12
e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04.2010.

Indlægssedlen kan også hentes på www.indlaegsseddel.dk.