

## **INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN**

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning  
Meropenem Fresenius Kabi 1g pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning

meropenem

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

### **Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Meropenem Fresenius Kabi
3. Sådan bliver du behandlet med Meropenem Fresenius Kabi
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

## **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Meropenem Fresenius Kabi tilhører en gruppe af stoffer, der hedder carbapenem-antibiotika. Det virker ved at dræbe bakterier, som kan give alvorlige infektioner.

- Infektion, der påvirker lungerne (pneumoni)
- Lunge- og bronkoinfektioner hos patienter, som lider af cystisk fibrose
- Kompliserede urinvejsinfektioner
- Kompliserede infektioner i maven
- Infektioner, som du kan få under eller efter fødslen
- Kompliserede hud- og bløddelsinfektioner
- Akut bakterieinfektion i hjernen (meningitis)

Meropenem Fresenius Kabi kan anvendes til behandling af patienter med neutropeni med feber, som mistænkes at være forårsaget af en bakterieinfektion.

Meropenem Fresenius Kabi kan anvendes til behandling af infektioner i blodet, som er forårsaget af bakterier, og som kan være forbundet med én af de ovenfor nævnte infektioner.

Lægen kan give dig Meropenem Fresenius Kabi for noget andet. Spørg lægen.

## **2. DET SKAL DU VIDE OM MEROPENEM FRESENIUS KABI**

**Du må ikke få Meropenem Fresenius Kabi:**

- Hvis du er allergisk over for meropenem eller et af de øvrige indholdsstoffer i Meropenem Fresenius Kabi (angivet i pkt. 6)
- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre antibiotika såsom penicilliner, cefalosporiner eller carbapenemer, fordi du så også kan være overfølsom over for meropenem.

### **Advarsler og forsigtighedsregler**

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Meropenem Fresenius Kabi:

- Hvis du har helbredsproblemer, såsom lever- og nyreproblemer
- Hvis du har fået alvorlig diaré, efter du har taget andre antibiotika.

Du kan udvikle en positiv test (Coombs test), som viser, at du har antistoffer, der kan ødelægge røde blodceller. Det vil din læge diskutere med dig.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, inden du får Meropenem Fresenius Kabi, hvis du er i tvivl, om nogle af ovenstående punkter gælder for dig.

### **Brug af anden medicin sammen med Meropenem Fresenius Kabi**

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det skyldes, at Meropenem Fresenius Kabi kan påvirke virkningen af andre lægemidler, og at andre lægemidler kan påvirke virkningen af Meropenem Fresenius Kabi.

Du skal specielt være opmærksom på at fortælle lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:

- Probenecid (bruges til behandling af gigt).
- Valproinsyre/natriumvalproat/valpromid (bruges til behandling af epilepsi). Meropenem Fresenius Kabi bør ikke anvendes, da det kan nedsætte virkningen af natriumvalproat.
- Orale antikoagulante stoffer (tages igennem munden og anvendes til at behandle og forebygge blodpropper)

### **Graviditet, amning og fertilitet**

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Man skal helst undgå at tage meropenem under graviditeten. Din læge vil beslutte, om du skal have meropenem.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du ammer eller planlægger at amme, før du får meropenem. Små mængder af denne medicin passerer over i modermælken. Derfor vil lægen bestemme, om du må bruge meropenem, mens du ammer.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Det er ikke undersøgt, om Meropenem Fresenius Kabi påvirker din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Meropenem Fresenius Kabi er imidlertid blevet forbundet med hovedpine, prikkende og stikkende hud (parastæsi) og ufrivillige muskelbevægelser, der kan føre til, at personens krop kommer til at ryste hurtigt og ukontrollabelt (kramper) og som almindeligvis ledsages af bevidstløshed og enhver af disse kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

### **Meropenem Fresenius Kabi indeholder natrium**

Meropenem Fresenius Kabi indeholder natrium.

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg: Dette lægemiddel indeholder 1,96 mmol (eller 45,13 mg) natrium per dosis på 500 mg. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Meropenem Fresenius Kabi 1,0 g: Dette lægemiddel indeholder 3,92 mmol (90,25 mg) natrium per dosis på 1,0 g. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du lider af en sygdom, som betyder, at du skal holde øje med dit saltindtag.

### **3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED MEROPENEM FRESENIUS KABI**

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

#### **Brug til voksne**

Dosis afhænger af, hvilken type infektion du har, hvor infektionen er i kroppen, og hvor alvorlig den er. Din læge vil beslutte, hvilken dosis du skal have.

Den normale dosis til voksne er mellem 500 mg (milligram) og 2 g (gram). Du vil normalt få en dosis hver 8. time. Hvis dine nyrer ikke fungerer så godt, kan det være, at du ikke får en dosis så tit.

#### **Brug til børn og teenagere**

Dosis til børn i alderen 3 måneder til 12 år bliver bestemt ud fra alder og barnets vægt. Den normale dosis er mellem 10 mg og 40 mg Meropenem Fresenius Kabi pr. kilogram (kg), barnet vejer. Der gives normalt en dosis hver 8. time. Børn, der vejer over 50 kg, skal have voksendosis.

#### **Sådan bruges Meropenem Fresenius Kabi**

- Du vil få Meropenem Fresenius Kabi som en injektion eller infusion ind i en stor blodåre.
- Normalt vil en læge eller sygeplejerske give dig Meropenem Fresenius Kabi.
- Dog er der nogle patienter, forældre eller hjælpere, der er oplært i at give Meropenem Fresenius Kabi i hjemmet. Vejledning til dette findes i denne indlægsseddel (under punktet "Vejledning om at give Meropenem Fresenius Kabi til dig selv eller en anden i hjemmet"). Anvend altid Meropenem Fresenius Kabi nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen, hvis du er i tvivl.
- Din injektion bør ikke blandes med eller tilsættes opløsninger, som indeholder anden medicin.
- Det kan tage 5 minutter eller mellem 15 og 30 minutter af få injektionen. Din læge vil fortælle dig, hvordan du skal have Meropenem Fresenius Kabi.
- Du skal normalt have din injektion på samme tid hver dag.

Spørg din læge eller sundhedspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af produktet.

#### **Hvis du har fået for meget Meropenem Fresenius Kabi**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har fået mere Meropenem Fresenius Kabi, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

#### **Hvis en dosis er glemt**

Hvis du har glemt at få en injektion, skal du have den så snart som muligt. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over.

Du må ikke få en dobbeltdosis (to injektioner på samme tid) som erstatning for den glemte dosis.

#### **Hvis behandlingen bliver stoppet**

Stop ikke med at få Meropenem Fresenius Kabi, før din læge siger, at du skal.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

### **4. BIVIRKNINGER**

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### **Alvorlige allergiske reaktioner**

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, **skal du stoppe med at få Meropenem Fresenius Kabi og straks søge læge**. Du kan have brug for akut medicinsk behandling. Tegnene kan omfatte pludselig forekomst af:

- Alvorligt udslæt, kløe eller nældefeber på huden.
- Hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen.
- Åndenød, hvæsen eller problemer med at trække vejret.

### **Ødelæggelse af røde blodceller (hyppighed ikke kendt)**

Tegnene er:

- Du bliver forpustet, når du ikke forventer det.
- Rød eller brun urin.

Hvis du får nogle af ovennævnte symptomer, **skal du straks søge læge**.

### **Andre bivirkninger:**

#### **Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):**

- Mavesmerter.
- Kvalme.
- Opkastning.
- Diaré.
- Hovedpine.
- Hududslæt, kløende hud.
- Smerte og betændelse (inflammation).
- Øget antal blodplader i dit blod (ses ved en blodprøve).
- Ændringer i blodprøveresultater, inklusive prøver som viser, hvordan din lever fungerer.

#### **Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):**

- Forandringer i dit blod. Disse omfatter et nedsat antal blodplader (som kan gøre, at du lettere får blå mærker), øget antal af nogle hvide blodceller, nedsat antal af andre hvide blodceller og et øget indhold af et stof, som kaldes bilirubin. Din læge kan af og til tage blodprøver på dig.
- Forandringer i blodprøveresultater, herunder undersøgelser, som viser, hvor godt dine nyrer virker.
- En stikkende fornemmelse.
- Infektion i mund eller skede, som skyldes svamp (trøske).
- Betændelse i tarmene med diarré.
- Ømme vener, dér hvor Meropenem Fresenius Kabi bliver sprøjtet ind.
- Andre forandringer i dit blod. Symptomerne kan være, at du tit har infektioner, feber eller ondt i halsen. Din læge kan af og til tage blodprøver på dig.
- Pludselig alvorligt udslæt, blære eller afskallende hud. Dette kan være ledsaget af høj feber og ledsmerter

#### **Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):**

- Krampeanfald

#### **Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):**

- Alvorlige overfølsomhedsreaktioner omfattende feber, hududslæt og forandringer i blodprøver, der undersøger, hvordan leveren fungerer (forhøjet niveau af leverenzymmer) og en stigning i en type

hvide blodlegemer (eosinofili) og forstørrede lymfekirtler. Dette kan være tegn på en overfølsomhedsreaktion, der påvirker flere organer, kendt som DRESS-syndrom.

#### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk), med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

### **5. OPBEVARING**

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C

Efter opløsning: Den fremstillede opløsning til intravenøs injektion eller infusion skal anvendes med det samme. Tidsintervallet fra påbegyndelse af opløsning og til afslutning af den intravenøse injektion eller infusion bør ikke overstige en time.

Opløsningen må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

### **6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER**

#### **Meropenem Fresenius Kabi indeholder:**

- Det aktive stof er meropenemtrihydrat.  
Meropenem Fresenius Kabi 500 mg: Hvert 20 ml hætteglas/100 ml flaske indeholder 500 mg meropenem.  
Meropenem Fresenius Kabi 1 g: Hvert 20 ml hætteglas, 50 ml/100 ml flaske indeholder 1000 mg meropenem.
- Øvrigt indholdsstof: vandfrit natriumcarbonat

#### **Udseende og pakningsstørrelser**

Meropenem Fresenius Kabi er et hvidt til lysegult pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning i hætteglas.

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg: 20 ml hætteglas og 100 ml glasflaske.

Meropenem Fresenius Kabi 1 g: 20 ml hætteglas, 50 ml og 100 ml glasflasker.

Pakningsstørrelsen er 1 eller 10 hætteglas/flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

#### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Fresenius Kabi AB  
751 74 Uppsala  
Sverige

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB  
Islands Brygge 57  
2300 København S

**Fremstillere:**

FACTA FARMACEUTICI S.p.A.  
Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64100 Teramo  
Italien

og

Fresenius Kabi Deutschland GmbH  
61346 Bad Homburg v.d.H

Frigivelsesadresse:

Pfingstweide 53, 61169 Friedberg  
Tyskland

og

LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)  
Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros  
Portugal

**Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Østrig</b>    | Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung<br>Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Belgien</b>   | Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung<br>Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung |
| <b>Bulgarien</b> | Meropenem Kabi 500 mg<br>Meropenem Kabi 1 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cypern</b>    | Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση<br>Meropenem Kabi 1g, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tjekkiet</b>  | Meropenem Kabi 500 mg<br>Meropenem Kabi 1g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danmark</b>    | Meropenem Fresenius Kabi                                                                                                                                                          |
| <b>Estland</b>    | Meropenem Kabi 500 mg<br>Meropenem Kabi 1000 mg                                                                                                                                   |
| <b>Tyskland</b>   | Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung<br>Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung           |
| <b>Grækenland</b> | Meropenem Kabi 500 mg, <i>κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση</i><br>Meropenem Kabi 1g, <i>κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση</i>                  |
| <b>Finland</b>    | Meropenem Fresenius Kabi 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten<br>Meropenem Fresenius Kabi 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten                         |
| <b>Ungarn</b>     | Meropenem Kabi 500 mg<br>Meropenem Kabi 1 g                                                                                                                                       |
| <b>Irland</b>     | Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion<br>Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion                                                     |
| <b>Letland</b>    | Meropenem Kabi 500 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai<br>Meropenem Kabi 1000 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai                       |
| <b>Litauen</b>    | Meropenem Kabi 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui<br>Meropenem Kabi 1000 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui                                     |
| <b>Luxembourg</b> | Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung<br>Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung |
| <b>Holland</b>    | Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie<br>Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie                     |
| <b>Norge</b>      | Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske, oppløsning<br>Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske, oppløsning   |
| <b>Polen</b>      | Meropenem Kabi                                                                                                                                                                    |
| <b>Portugal</b>   | Meropenem Kabi 500 mg Pó para solução injectável ou para perfusão<br>Meropenem Kabi 1 g Pó para solução injectável ou para perfusão                                               |
| <b>Rumænien</b>   | Meropenem Kabi 500 mg pulbere pentru soluție injectabilă sau perfuzabilă<br>Meropenem Kabi 1 g pulbere pentru soluție injectabilă sau perfuzabilă                                 |
| <b>Spanien</b>    | Meropenem Kabi 500 mg polvo para solución inyectable o para perfusión<br>Meropenem Kabi 1 g polvo para solución inyectable o para perfusión                                       |

|                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sverige</b>   | Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning<br>Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning |
| <b>Slovenien</b> | Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje<br>Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje                                       |
| <b>Slovakiet</b> | Meropenem Kabi 500 mg<br>Meropenem Kabi 1 g                                                                                                                                               |
| <b>England</b>   | Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion<br>Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion                                                             |

**Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2016.**

### **Vejledning/medicinsk oplysning**

Antibiotika bruges til at behandle infektioner, der skyldes bakterier. De virker ikke mod infektioner, som skyldes vira.

Infektioner, der skyldes bakterier, reagerer ikke altid på antibiotikabehandling. En af de mest almindelige årsager til det er, at bakterien, som er skyld i infektionen, er resistent over for det antibiotikum, der tages. Dette betyder, at bakterierne kan overleve og endda formere sig på trods af antibiotika.

Bakterier kan blive resistente over for antibiotika af mange årsager. Omhyggeligt brug af antibiotika kan hjælpe med til at nedsætte risikoen for, at bakterier bliver resistente over for dem.

Når din læge udskriver en antibiotikabehandling, er det kun beregnet til at behandle din aktuelle sygdom. Ved at være opmærksom på de følgende råd kan du hjælpe med til at forebygge, at der opstår resistente bakterier, som kan forhindre, at antibiotikumet virker.

1. Det er meget vigtigt, at du tager antibiotikumet i den korrekte dosis, på det korrekte tidspunkt og i det korrekte antal dage. Læs vejledningen i indlægssedlen og bed din læge eller apoteket om at forklare det, hvis der er noget, som du ikke forstår.
2. Du skal ikke tage et antibiotikum medmindre det er blevet udskrevet specifikt til dig, og du skal kun bruge det til at behandle den infektion, det er udskrevet til.
3. Du skal ikke tage antibiotika, der er udskrevet til andre personer, heller ikke selvom de har haft en infektion, der er magen til din.
4. Du må ikke give antibiotika, som er udskrevet til dig, til andre.
5. Hvis du har noget antibiotikum tilovers, når du har taget din behandling efter din læges anvisning, skal du aflevere resterne på apoteket, som vil destruere det på behørig vis.

### **Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale**

#### **Vejledning om at give Meropenem Fresenius Kabi til dig selv eller til andre i hjemmet**

Nogle patienter, forældre eller hjælpere er oplært til at give Meropenem Fresenius Kabi i hjemmet.

**Advarsel – Du må kun give denne medicin til dig selv eller andre i hjemmet, efter du er oplært af en**



**læge eller sygeplejerske.**

### **Sådan blandes medicinen**

Denne medicin skal blandes med en anden væske (opløsningsmidlet). Din læge vil fortælle dig, hvor meget opløsningsmiddel du skal bruge.

Brug medicinen lige efter den er blandet. Opløsningen må ikke fryses.

1. Vask dine hænder og tør dem godt. Forbered et rent arbejdsområde.
2. Tag flasken (hætteglasset) med Meropenem Fresenius Kabi ud af æsken. Tjek hætteglasset og udløbsdatoen. Tjek, at hætteglasset er intakt og ikke er blevet skadet.
3. Fjern den farvede hætte og rengør den grå gummiprop med en spritserviet. Vent til gummiproppen er tør.
4. Saml en ny, steril nål med en ny, steril sprøjte uden at røre ved enderne.
5. Træk den anbefalede mængde sterilt ”vand til injektionsvæsker” op i sprøjten. Mængden af væske, som du skal bruge, er vist i tabellen nedenfor:

| Dosis Meropenem Fresenius Kabi | Mængde ”vand til injektionsvæsker”, der skal bruges til opløsning |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 500 mg (milligram)             | 10 ml (milliliter)                                                |
| 1 g (gram)                     | 20 ml                                                             |
| 1,5 g                          | 30 ml                                                             |
| 2 g                            | 40 ml                                                             |

**Vær opmærksom på:** Du skal bruge mere end 1 hætteglas, hvis din dosis af Meropenem Fresenius Kabi er større end 1 g. I så fald kan du trække væsken fra hætteglassene ind i den ene sprøjte.

6. Stik nålen på sprøjten igennem midten af den grå gummiprop og injicer den anbefalede mængde af vand til injektionsvæsker ind i hætteglasset eller hætteglassene med Meropenem Fresenius Kabi.
7. Træk nålen ud af hætteglasset og ryst hætteglasset godt i cirka 5 sekunder, eller indtil alt pulveret er opløst. Tør den grå gummiprop en gang mere med en ny spritserviet og lad gummiproppen tørre.
8. Med stemplet trykket helt i bund på sprøjten stikkes nålen tilbage gennem den grå gummiprop. Derefter skal du holde ved både sprøjten og hætteglasset og vende det på hovedet.
9. Mens spidsen af nålen holdes i væsken, trækkes stemplet tilbage, og alt væsken suges fra hætteglasset ind i sprøjten.
10. Træk nål og sprøjte ud af hætteglasset og kassér det tomme hætteglas på behørig vis.
11. Hold sprøjten lodret med nålen pegende opad. Bank forsigtigt på sprøjten, så alle luftbobler i væsken kommer op i toppen af sprøjten.

12. Fjern al luft fra sprøjten ved forsigtigt at trykke på stemplet, indtil al luft er forsvundet.
13. Hvis du bruger Meropenem Fresenius Kabi derhjemme så kassér nåle og infusionsslanger, som du har brugt, på en sikker måde. Hvis din læge beslutter, at du skal stoppe behandlingen, så aflever ubrugt Meropenem Fresenius Kabi på apoteket.

### **Indgivelse af injektionen**

Du kan enten give medicinen gennem en kort kanyle eller et venflon eller gennem adgang via centralt kateter.

### **Indgivelse af Meropenem Fresenius Kabi gennem en kort kanyle eller venflon**

1. Fjern nålen fra sprøjten og smid på en sikker måde nålen i din kanylespand.
2. Tør enden af den korte kanyle eller venflon af med en spritserviet og lad den tørre. Åben hættten på din kanyle og sæt sprøjten til.
3. Tryk langsomt på sprøjtestemplet for at give antibiotikummet jævnt i løbet af cirka 5 minutter.
4. Når du er færdig med at give antibiotikummet, og sprøjten er tom, fjernes sprøjten, og der gennemskylles med det, din læge eller sygeplejerske har anbefalet dig.
5. Luk hættten på din kanyle og smid på sikker måde kanylen i din kanylespand.

### **Indgivelse af Meropenem Fresenius Kabi gennem adgang via centralt kateter**

1. Fjern hættten på adgangen og rens enden af kateteret med en spritserviet og lad det tørre.
2. Sæt sprøjten til og tryk langsomt på sprøjtestemplet for at give antibiotikummet jævnt i løbet af cirka 5 minutter.
3. Når du er færdig med at give antibiotikummet, fjernes sprøjten, og der gennemskylles med det, din læge eller sygeplejerske har anbefalet dig.
4. Sæt en ny, ren hætte på dit centrale kateter og smid på sikker måde sprøjten i din kanylespand.