

Indlægsseddel: Information til brugeren

Penomax® 200 mg filmoovertrukne tabletter

Pivmecillinamhydrochlorid

05-2018
P386970-7

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax
3. Sådan skal du tage Penomax
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Penomax, pivmecillinam, er et antibiotikum, der tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes penicilliner. Penomax virker ved at dræbe de bakterier, der forårsager infektionerne. Hvis infektionen ikke behandles, kan bakterien fortsætte med at formere sig i kroppen.

Penomax bruges til behandling af infektion i urinvejene.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Penomax:

- hvis du er allergisk over for pivmecillinam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Penomax (angivet i afsnit 6).
- hvis du er allergisk over for penicillin eller antibiotika af typen cephalosporiner.
- hvis du har en kendt forsnævring af spiserøret, og/eller hvis der er noget i din mave-tarmkanal, der forhindrer normal passage.
- hvis du har en kendt arvelig stofskifteforstyrrelse såsom en tilstand, der kan nedsætte mængden af et stof, der hedder carnitin i din krop.
- hvis du har en kendt arvelig stofskifteforstyrrelse, hvor du har for meget syre i dit blod (acidæmi) eller i urinen (aciduri).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Penomax hvis:

- du ved, du har porfyri (en sjælden stofskiftesygdom)
- du ved, du har mangel på carnitin (en aminosyre)
- du har en ustabil sukkersyge eller en unormalt lille muskelmasse
- du får kraftig diarré under behandlingen med Penomax.

Brug af anden medicin sammen med Penomax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Penomax og/eller Penomax kan påvirke virkningen af anden medicin.

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager noget af følgende:

- methotrexat (til behandling af gigt, kræft og psoriasis)
- probenecid (til behandling af urinsur gigt)
- valproinsyre eller valproat (anvendes til behandling af epilepsi)
- enhver anden antibiotika (til behandling af infektioner såsom erythromycin eller tetracyclin).

Brug af Penomax sammen med mad og drikke

Penomax tabletter skal synkes hele med mindst et halvt glas væske, enten stående eller siddende (se afsnit 3 "Sådan skal du tage Penomax"). Det er vigtigt at du tager din medicin sammen med rigeligt væske. Det vil forhindre at du får betændelse i spiserøret. Læs venligst afsnit 4 i denne indlægsseddel så du kan opdage hvis dette sker for dig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Penomax kan anvendes under graviditet, hvis din læge anser det nødvendigt.

Amning

Du kan tage Penomax, selvom du ammer.

Fertilitet

Der er ikke udført kliniske studier vedrørende fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Penomax påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Kontakt din læge hvis du oplever en bivirkning som kan forhindre dig i at køre eller betjene maskiner.

3. Sådan skal du tage Penomax

Tag altid Penomax nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge:

200-400 mg (1-2 tabletter) 3 gange dagligt.

Brug til børn

Børn over 5 år:

200 mg 3 gange dagligt.

Du skal tage tabletterne enten i siddende eller stående stilling. Drik mindst et halvt glas vand eller anden væske, når du tager tabletten. Tag helst tabletten sammen med et måltid for at undgå mavegener.

Brugsanvisning for tabletterne, som er pakket i blister:

- Tryk ikke tabletten ud af tabletlommen (fig. 1).
- Bøj blisteret og riv en tabletlomme af langs med den stiplede linje (fig. 2).
- Fjern forsigtigt folien, begynd i det hjørne, der er markeret med en pil (fig. 3).

Figur 1



Figur 2



Figur 3



Hvis du har taget for mange Penomax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Penomax, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

En meget stor dosis kan medføre kvalme, opkastning og mavekatar (gastritis).

Hvis du har glemt at tage Penomax

Tag den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Vent herefter 4 timer inden du tager næste dosis, så mængden af medicin i din krop forbliver ensartet. Herefter skal du fortsætte med medicinen, som sædvanlig. Husk at tage medicinen regelmæssigt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Penomax

Tag tabletterne i så lang tid, som din læge har sagt. Det er vigtigt, at du overholder hele behandlingsforløbet, selvom du føler dig bedre tilpas efter nogle dage. Hvis du holder op med at tage tabletterne for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Vigtige bivirkninger, som du skal være opmærksom på

Du skal straks søge lægehjælp, hvis du får et eller flere af følgende symptomer. De kan være tegn på en allergisk reaktion (meget sjælden bivirkning, kan påvirke op til 1 ud af 10 000 personer):

- hvis du får vejrtrækningsbesvær
- hvis dit ansigt eller svælg hæver op
- hvis du får et alvorligt udslæt eller områder med pludselige hævelser i huden.

Du skal straks søge lægehjælp, hvis du får følgende symptom:

- kraftig diarré. Dette kan være forårsaget af betændelse i tyktarmen.

Andre mulige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer

- kvalme
- opkastning
- diarré

Ikke almindelige bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer

- udslæt

Sjældne bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer

- nældefeber
- nedsat koncentration af aminosyren carnitin i kroppen (hvilket kan medføre træthed, forvirring eller muskelsvaghed).

Meget sjældne bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer

- ændringer i blodtællingen (nedsat antal hvide blodlegemer eller blodplader, øget antal eosinofile celler i blodet)
- betændelse i spiserøret
- forstyrrelser i leverfunktionen
- drug feber (feber, der skyldes behandlingen)
- svær infektion med svampen candida.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Penomax utilgængeligt for børn.

Blister: Opbevares under 30 °C i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Tabletbeholder: Hold tabletbeholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Tag ikke Penomax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Penomax indeholder:

- Aktivt stof: pivmecillinamhydrochlorid. Hver fillovertrukken tablet indeholder 200 mg.
- Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: mikrokrySTALLinsk cellulose og magnesiumstearat.
- Øvrige indholdsstoffer i fillovertrukket: hypromellose og triacetin.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide til råhvide, runde, hvælvede, fillovertrukne tabletter, præget med "F" på den ene side og "48" på den anden side.

Pakningsstørrelser:

Bliſter: 20, 30 og 40 fillovertrukne tabletter.

Tabletbeholder: 100 fillovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømmervej 9

6710 Esbjerg V

Penomax® er et registreret varemærke, der tilhører Orion Corporation.

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2018.