

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Rifampicin 2care4 300 mg, kapsler, hårde

Rifampicin

05-2012
P171204-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Rifampicin 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rifampicin 2care4
3. Sådan skal du tage Rifampicin 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Rifampicin 2care4 er et antibiotikum, der virker på visse bakteriestammer.

Du kan tage Rifampicin 2care4 til behandling af tuberkulose og til forebyggende behandling hvis du har været i nærkontakt med patienter med meningitis.

Lægen kan have givet dig Rifampicin 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE RIFAMPICIN 2CARE4

Tag ikke Rifampicin 2care4 hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for rifampicin, andre antibiotika (rifamyciner) eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har haft leverbetændelse udløst af medicin.
- har haft akut leverbetændelse.
- lider af den sjældne, arvelige stofskiftesygdom, porfyri.
- har alvorligt nedsat nyrefunktion.
- er i behandling med medicin mod svamp (voriconazol eller itraconazol og visse proteasehæmmere – undtaget ritonavir i fuld dosis eller 600 mg 2 gange daglig).

Vær ekstra forsigtig med at tage Rifampicin 2care4

Tal med lægen, inden du giver Rifampicin 2care4 til et for tidlig født eller et nyfødt barn.

Tal med lægen, inden du tager Rifampicin 2care4, hvis du

- har eller har haft dårlige nyrer.
- har en leversygdom, er alkoholiker eller er underernæret. Lægen vil muligvis foretage ekstra undersøgelser før og eventuelt under behandling med Rifampicin 2care4.
- får influenzalignende symptomer.

Kontakt straks din læge, hvis du får

- alvorlige allergiske reaktioner som forandringer i blodet (for få blodplader), spontant opstået blødninger i hud og/eller slimhinder (purpura), alvorlig blodmangel med gulsot, åndedrætsbesvær, astmalignende anfald, for lavt blodtryk, bevidsthedstab eller nyresvigt.
- feber eller hudreaktioner.
- mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst.

Vær opmærksom på følgende:

- Rifampicin 2care4 nedsætter virkningen af p-piller og minipiller. Du skal bruge kondom, pessar eller lignende som svangerskabsforebyggelse, mens du er i behandling med Rifampicin 2care4 og 4 uger efter.
- Rifampicin 2care4 kan farve urin, hud og kropsvæsker (f.eks. sved, spyt og tårevæske) rødorange.
- Bløde kontaktlinser kan misfarves.
- Hvis du har dårlig lever, vil din læge normal undersøge dit blod regelmæssigt under behandlingen med Rifampicin 2care4.
- Undgå uregelmæssig behandling, dvs. hold ikke pause i behandlingen.
- Ved behandling af infektioner bliver Rifampicin 2care4 altid kombineret med anden medicin for at undgå udvikling af modstandsdygtige bakterier.
- Anbefales ikke til børn under 6 år.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Rifampicin 2care4. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du må ikke tage følgende medicin samtidig med eller indtil 2 uger efter behandling med Rifampicin 2care4 er stoppet:

- medicin mod svamp (voriconazol).
- medicin mod HIV (proteasehæmmere - fosamprenavir, sakvinavir, indinavir, nelfinavir, lopinavir, atazanavir, tipranavir, darunavir og ritonavir).

Tal med din læge, hvis du tager

- syreneutraliserende medicin (antacida) mod for meget mavesyre. Du må tidligst tage syreneutraliserende medicin 1 time efter, du har taget Rifampicin 2care4.
- medicin mod forhøjet kolesterol (statiner såsom simvastatin, fluvastatin, atorvastatin).
- p-piller og minipiller.
- medicin mod HIV (efavirenz, zidovudin, nevirapin, raltegravir, miravirac, abacavir, amprenavir, etravirin).
- medicin til behandling af kræft (imatinib, gefitinib, irinotecan, tamoxifen).
- medicin mod mavesyre (ranitidin, antacida).
- tabletter mod sukkersyge (repaglinid, glibenclamid, gliclazid, glitazon).
- hjertemedicin (digoxin, disopyramid, propafenon, metoprolol, propranolol, carvedilol, lersartan, verapamil, amlodipin, mexiletin, tocainid, lorcinid, diltiazem, nifedipin, isradipin, enalapril).
- blodfortyndende medicin (warfarin).
- binyrebarkhormoner (kortikosteroider, prednisolon).
- kvindelige kønshormoner (østrogen, progestagen).
- medicin mod for lavt stofskifte (levotyroxin).
- medicin mod brystkræft (tamoxifen).

- medicin mod betændelse (clarithromycin, telithromycin, chloramphenicol, ethionamid, doxycyclin, metronidazol, sulfamethoxazol, trimethoprim, linezolid).
- visse typer medicin mod svamp (terbinafin, dapson, ketoconazol, itraconazol, fluconazol).
- medicin mod malaria (atovaquon, chloroquin, mefloquin, quinin, lumefantrine).
- medicin, der nedsætter immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus, sirolimus).
- morfin og morfinlignende midler (methadon, morfin, codein).
- medicin mod epilepsi (lamotrigin, fenobarbital, valproat, carbamazepin, phenytoin).
- medicin mod sindslidelser (clozapin, haloperidol).
- medicin mod angst og uro (buspiron, diazepam, chlorpromazin, amitriptylin, aripiprazol).
- sovemedicin (zolpidem, zaleplon).
- medicin mod astma og allergi (theophyllin).
- medicin mod smerter (acetaminofen, paracetamol).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Rifampicin 2care4, og Rifampicin 2care4 kan påvirke virkningen af anden medicin. Det kan være indtil 3 uger efter du er stoppet med behandlingen med Rifampicin 2care4. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Rifampicin 2care4 sammen med mad og drikke

Du skal tage Rifampicin 2care4 sammen med et glas vand ½-1 time før et måltid for at opnå den bedste virkning.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Rifampicin 2care4 efter aftale med lægen.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Rifampicin 2care4 og i 4 uger derefter. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Rifampicin 2care4, da Rifampicin 2care4 går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rifampicin 2care4 kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Rifampicin 2care4

Rifampicin 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE RIFAMPICIN 2CARE4

Tag altid Rifampicin 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er Tuberkulose

Voksne:

450-600 mg 1 gang dagligt.

Børn:

10-20 mg/kg 1 gang daglig (max 600 mg i døgnet). Dosis afhænger af barnets vægt. Dosis til et barn der vejer 30 kg vil normalt være 300-600 mg (1-2 kapsler) 1 gang dagligt. Tal med lægen.

Forebyggelse af meningitis

Voksne:

600 mg (2 kapsler) hver 12. time i 2 dage.

Børn: 1-12 år:

10 mg/kg hver 12. time i 2 dage. Dosis afhænger af barnets vægt. Dosis til et barn der vejer 30 kg vil normalt være 300 mg (1 kapsel) hver 12. time i 2 dage.

Børn under 1 år:

5 mg/kg hver 12. time i 2 dage.

Du kan ikke bruge Rifampicin 2care4 kapsler til børn under 1 år.

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge Rifampicin 2care4 300 mg kapsler til alle de anførte doseringer.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion, må du ikke tage Rifampicin 2care4.

Hvis du har haft leverbetændelse på grund af medicin eller akut leverbetændelse, må du ikke tage Rifampicin 2care4.

Hvis du har taget for mange Rifampicin 2care4 kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Rifampicin 2care4 kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er mavebesvær, opkastning, svedudbrud, åndedrætsbesvær, kramper, nyresvigt, påvirkning af leveren, bevidsthedssvækkelse, kløe, rødlig til orange misfarvning af hud og urin og hævelser i ansigtet, vand i lungerne.

Hvis du har glemt at tage Rifampicin 2care4

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Rifampicin 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Rifampicin 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Akut forværring af Addisons sygdom (mangel på binyrebarkhormon) med opkastninger, mavekrampe og bevidsthedsforstyrrelser. Kontakt straks læge eller skadestue.

- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed og leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som fx angst. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Pludselige opståede blødninger i huden, besvimelse, meget dårlig almen tilstand, og evt. åndedrætsbesvær. Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt kan være pga. udskillelse af hæmoglobin i urinen. Kontakt læge eller skadestue.
- Træthed, madlede, kvalme, opkastninger, smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse evt. hævelser af hænder, fødder og ansigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
- Livstruende symptomkompleks med infektioner i huden, som løses i store flager. Kontakt læge eller skadestue.
- Hudsygdom med blærer og afskalning af huden. Kontakt læge eller skadestue.
- Besvimelse eller shock. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
- Psykoser / Sindslidelser. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Døsighed, hovedpine, uklarhed, svimmelhed.
- Permanent misfarvning af bløde kontaktlinser.
- Rødlig misfarvning af kropsvæsker og -sekreter, såsom urin, spyt, tårer, fæces og sved.
- Røde øjne.
- Madlede, kvalme, mavesmerter, oppustethed.
- Kløe med eller uden udslæt, nældefeber, ansigtsrødmen.
- Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Usikre bevægelser.
- Opkastning og diaré.
- Menstruationsforstyrrelser, i sjældne tilfælde udebleven menstruation.
- Forvirring.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Synsforstyrrelser.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Blod i urinen. Kontakt lægen.

- Lokal celle- el. vævsdød.
- Muskelsvaghed kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Sårfyldt irritation af mavesækkens slimhinde (med blødning).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Influenza-lignende symptomer.

Rifampicin 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks påvirkning af leveren, forhøjet antal hvide blodlegemer i blodet (eosinofili) og påvirkning af nyrerne.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Rifampicin 2care4 ved temperaturer over 30 °C.

Tag ikke Rifampicin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Rifampicin 2care4 300 mg kapsler, hårde indeholder:

Aktivt stof : Rifampicin.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumstearat, lactose, gelatine, shellac, rød og gul jernoxid (E 172), titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hård, rødbrun, uigennemsigtig, gelatine kapsel. Den ene halvdel er påtrykt "300" og den anden halvdel "NG".

Pakningsstørrelser

Rifampicin 2care4 300 mg fås i en pakningsstørrelse á 100 kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Rifampicin 2care4 svarer til Rimactan.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2012.