

Hvis du har anvendt for mange Angicor tabletter:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Angicor, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Symptomerne på overdosering er svimmelhed og hurtig hjertebanken. Du kan også miste bevidstheden kortvarigt.

Hvis du har glemt at anvende Angicor

Har du glemt at anvende en tablet, fortsætter du blot med at anvende næste tablet til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

4. BIVIRKNINGER

Angicor kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
Overfølsomhedsreaktion med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, hævelse af tunge, læber og ansigt. Brystmerter.
Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige (sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Hovedpine, især i starten af behandlingen.

Almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Kvalme og opkastning, svimmelhed, rødmen.

Ikke almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
Følelse af svaghed, lavt blodtryk og/eller hurtig hjerterytme (specielt efter høje doser i begyndelsen af behandlingen),

Sjældne bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
Hjertebanken. Blegner eller sår i munden, på tungen og ved endetarmsåbningen. De opstår hyppigere når du tager mere end 30 mg daglig. Sårerne heles efter nogle uger, når behandlingen stoppes. Udslæt, ændringer i leverfunktion.

Meget sjældne bivirkninger (sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
Blødninger i mave og tarm, blødninger i huden (kontakt din læge), øget følsomhed overfor lys. Muskelsmerter.
Der kan i meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.meldenbivirkning.dk/>

5. OPBEVARING

Opbevar Angicor utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Angicor over 25°C.

Anvend ikke Angicor efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar Angicor i original emballage, tæt tillukket, da lægemidlet er følsomt over for fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Angicor tabletter 10 mg er hvide tabletter med delekærv, mærket IK 10 på den ene side.

Angicor tabletter 20 mg er hvide tabletter med delekærv, mærket IK 20 på den ene side.

Angicor indeholder:

Angicor 10 mg og 20 mg.
Det virksomme stof i Angicor er nicorandil. De øvrige indholdsstoffer er: majsstivelse; croscarmellosenatrium; stearinsyre og mannitol.

Indehaver af markedsføringstilladelsen
sanofi-aventis Denmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Fremstiller:

Sanofi Winthrop Industrie, 56 route de Choisy au Bac, 60205 Compiègne, Frankrig.

Revideret April 2009

Angicor® tabletter 10 mg og 20 mg Nicorandil

sanofi aventis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at anvende medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Angicor tabletter til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Angicor.
3. Sådan skal du anvende Angicor.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Angicor udvider blodkarrene i hjertet, så blodtilførslen og dermed også iltforsyningen til hjertet bliver bedre. Du kan anvende Angicor til at forebygge hjertekramper (angina pectoris).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE ANGICOR

Anvend ikke Angicor hvis du:

- er overfølsom over for det aktive indholdsstof (nicorandil) eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Angicor.
- er i behandling mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).
- har for lavt blodtryk.
- lider af alvorlig nedsat hjertefunktion

Vær ekstra forsigtig med at anvende Angicor
Kontakt lægen, hvis du:

- lider af for lavt blodtryk.
 - har haft et stort blodtab.
 - lider af alvorlige hjerteproblemer, eller har haft et hjerteanfald for nyligt.
 - anvender anden blodtryksænkende medicin.
 - har vand i lungerne (akut lungeødem).
- Hvis du oplever blødning i huden, eller du får symptomer på blødninger i mave-tarmsystemet, skal du tale med din læge.

Tal med lægen hvis du får vedvarende blegner eller sår i munden eller ved endetarmen.

Anvendelse af anden medicin

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Angicor, og Angicor kan påvirke virkningen af andre lægemidler.

Tal med lægen, hvis du anvender:

- medicin mod hjertesygdom og for højt blodtryk.
- medicin mod depression (tricykliske antidepressiva).
- medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).
- medicin der indeholder corticosteroider (prednisolon, hydrocortison)

Vær opmærksom på, at den blodtryksænkende effekt af alkohol kan forstærkes ved samtidig indtagelse af Angicor. Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du anvender anden medicin eller har anvendt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du anvender nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun anvende Angicor efter lægens anvisning.

Amning:

Du bør ikke anvende Angicor, hvis du ammer. Tal med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Angicor tabletter kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken, f.eks. svimmelhed.

3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE ANGICOR

Tag altid Angicor nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Den sædvanlige dosering ses nedenfor.

Dosering

Voksne: 1 tablet på 10 mg 2 gange daglig stigende til 1 tablet på 20 mg 2 gange daglig. Din læge vil vurdere, om du eventuelt skal have anden dosis.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

