Smith & Nephew Record	
Item:	Zipzoc PIL (Denmark)
Code:	N/A
This BSC/Asset:	assetTBA
Prev BSC/Asset:	15921 / 0504204
Date:	17.05.2011
This Revision:	01

ADAMS DESIGN Record	
Job No:	TT-PER.02.00
Dims:	210 x 300mm
Colours: (Match to Pantone colors)	Process Black

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

smith&nephew

ZIPZOC◇

20% Imprægneret gaze zinkoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få ZIPZOC uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for ZIPZOC.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre.
- Tal med lægen, apoteket eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1 Virkning og anvendelse
2 Det skal du vide, før du begynder at bruge ZIPZOC
3 Sådan skal du bruge ZIPZOC
4 Bivirkninger
5 Opbevaring
6 Yderligere oplysninger

1 VIRKNING OG ANVENDELSE

ZIPZOC er en steril rayonstrømpe imprægneret med en salve, der indeholder zinkoxid. Zinkoxid har en lindrende og beskyttende virkning.

ZIPZOC anvendes:

- som et hjælpemiddel i behandlingen af kroniske bensår.
- som et primært kontaktlag under en kompressionsforbinding eller en strømpe, hvis du har nedsat blodcirkulation i venerne (det vil sige, at blod i venerne føres langsommere fra fødder og ben til hjertet; dette kaldes også kronisk venøs insufficiens).

2 DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ZIPZOC

Brug ikke ZIPZOC:

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for zinkoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har arterielle bensår (bensår, der skyldes nedsat blodcirkulation i blodårer, men ikke i vener). Tal med din læge, hvis du er usikker på, hvilken slags bensår du har.

NO PRINT AREA 4 x 210mm

Vær ekstra forsigtig med at bruge ZIPZOC

- Hvis den ydre forbinding er uhensigtsmæssig, eller hvis strømpen ikke skiftes tilstrækkeligt ofte, kan strømpen tørre ud.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen, apoteket eller sygeplejersken, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Du kan bruge ZIPZOC under graviditet og amning. Spørg din læge, apoteket eller sygeplejersken til råds, før du tage nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

ZIPZOC påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3 SÅDAN SKAL DU BRUGE ZIPZOC

Brug altid ZIPZOC nøjagtigt efter lægens, apotekets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apoteket eller sygeplejersken.

Din tilstand er afgørende for, hvor længe du bør bruge ZIPZOC, og hvor mange gange det bør skiftes. Du kan få vejledning hos lægen, apoteket eller sygeplejersken.

Vask hænderne grundigt, før du tager strømpen på.

- Før foden ind i strømpen, og træk strømpen op, så den dækker underbenet fra tæerne (uden at dække tæerne) til knæet.
- Ret alle folder eller rynker ud.
- Overskydende materiale foldes tilbage fra knæet og nedad.
- Hvis lægmusklen er usædvanligt stor, bør du udvise forsigtighed, når du tager strømpen på, så bevægeligheden i underbenet ikke begrænses.
- Oven på ZIPZOC kan sygeplejersken eventuelt lægge en bandage som kompres i forbindelse med nedsat blodcirkulation og/eller for at beskytte tøjet.
- Forbindingen bør skiftes mindst én gang om ugen for at undgå risiko for infektion og for at forhindre udtørring af strømpen.

4 BIVIRKNINGER

ZIPZOC kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- smerter i området omkring bensåret.
- lokale hudreaktioner som f.eks. udslæt, rødmen og kløe
- yderligere forværring af såret.

Tal med lægen, apoteket eller sygeplejersken, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Læbemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted **www.meldenbivirkning.dk.**

5 OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar ikke ZIPZOC ved temperaturer over 30 °C. Brug ikke ZIPZOC efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen ("Anv. før") er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6 YDERLIGERE OPLYSNINGER

ZIPZOC 20% Imprægneret gaze indeholder:

- Aktivt stof: Zinkoxid
- Øvrige indholdsstoffer: hvid blød paraffin og paraffinolie

Udseende

ZIPZOC er en steril rayonstrømpe, længde: 80 cm.
Hver enkelt strømpe er pakket i en lamineret pose af polyethylenaluminiumsfolie.

Pakningsstørrelser

ZIPZOC leveres i æsker, som indeholder 1, 4 eller 10 poser.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Smith & Nephew A/S,
Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm.

Fremstiller:

Perstorp Specialty Chemicals AB,
Perstorp Pharma, SE-284 80 Perstorp,
Sverige.

*Varemærke tilhørende Smith & Nephew
Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2011

assetTBA