

Indlægsseddel: Information til brugeren

Erycin[®] 250 mg og 500 mg enterotabletter

Erythromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Erycin[®] til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Erycin[®]
3. Sådan skal du tage Erycin[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Erycin[®] er et antibiotikum af typen makrolid. Erycin[®] bruges til behandling af infektion.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Erycin[®]

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Erycin[®]:

- hvis du er allergisk over for erythromycin, anden medicin af samme type (makrolider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Erycin[®] (angivet i punkt 6)
- hvis du tager allergimedicin (terfenadin eller astemizol)
- hvis du tager medicin mod migræne (ergotamin, dihydroergotamin)
- hvis du tager medicin mod skizofreni og psykoser (pimozid)
- hvis du tager medicin mod mave-tarm-gener (cisaprid)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Erycin[®]:

- hvis du har nedsat leverfunktion
- hvis du har sygdommen myasthenia gravis (muskelsvaghed), da den kan forværres ved behandling
- hvis du får langvarig eller blodig diarré. Diarréen kan være let til alvorlig og måske kræve behandling
- hvis du er alvorligt syg, fordi samtidig behandling kan forårsage bivirkninger som muskelsmerter, muskelsvaghed og/eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne, med eller uden nedsat nyrefunktion (rhabdomyolyse)
- hvis du er gravid og behandles med Erycin[®] mod syfilis, skal dit barn også behandles med en passende penicillinkur efter fødslen.

- hvis du lider af hjerterytmeforstyrrelser og/eller bliver behandlet med lægemidler som f. eks. quinidin, og procainamid eller andre stoffer. Behandlingen kan forværre din hjertesygdom.
- hvis du er ældre (over 65 år).

Nyfødte som behandles med Erycin[®], f. eks. på grund af livstruende infektioner som kighoste, kan udvikle et snævert område (stenose) i udgangen af mavesækken (pylorus). Lægen skal afveje denne risiko mod fordelene af en behandling med Erycin[®].

En langvarig behandling med Erycin[®] kan medføre en overvækst af bakterier eller svampe, der er blevet modstandsdygtige over for behandlingen. I tilfælde af dette vil behandlingen stoppes og passende behandling indledes.

Fortæl altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Erycin[®].

Brug af anden medicin sammen med Erycin[®]

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- allergi (terfenadin, astemizol, mizolastin, der kan have livstruende indflydelse på hjertefunktionen)
- psykoser og skizofreni (pimozid, clozapin)
- mave-tarm-gener med halsbrand (cisaprid)
- migræne (ergotamin, dihydroergotamin)
- svampeinfektion (fluconazol, itraconazol og ketoconazol)
- forhøjet blodtryk (felodipin)
- Parkinsons sygdom, brystsmerte eller hæmning af mælkeproduktion (bromocriptin)
- astma (teofyllin)
- tuberkulose (rifampicin, rifabutin)
- angst og uro (triazolam, midazolam, alprazolam, buspiron)
- søvnforstyrrelser (phenobarbital, hexobarbital, zopiclon)
- hiv (saquinavir, proteasehæmmere)
- epilepsi (carbamazepin, phenytoin, valproat)
- depression (sertralin, perikon)
- forhøjet kolesterolkoncentration i blodet (lovastatin, simvastatin)
- hjertesygdomme (verapamil, digoxin, dofetilid, amiodaron, sotalol, quinidin, disopyramid)
- dannelse af blodpropper som har en blodfortyndende virkning (warfarin, acenocoumarol)
- nedsat potens (sildenafil)
- smerter (alfentanil)
- visse kræftsygdomme (vinblastin)
- for meget mavesyre (omeprazol, cimetidin)
- urinsyregigt (colchicin)
- smerter ved gang også kaldet vindues-kigger-syge (cilostazol)
- infektioner (antibiotika, som f.eks. penicillin, cefalosporin, clindamycin, lincomycin, chloramphenicol, streptomycin, clarithromycin, tetracykliner og colistin).

Informér ligeledes din læge, hvis du tager medicin til at nedsætte immunforsvaret (tacrolimus, everolimus, ciclosporin, ciclosporin) og binyrebarkhormoner (f. eks. methylprednisolon).

Præventionsmidler, som p-piller kan ved samtidig anvendelse have en nedsat virkning.

Brug af Erycin[®] sammen med mad og drikke

Du bør tage Erycin[®] umiddelbart før et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Erycin[®], hvis du er gravid eller planlægger graviditet, men i visse tilfælde kan din læge vurdere, at behandlingen er nødvendig.

Amning

Erythromycin bliver udskilt i modermælken. Du må derfor så vidt muligt ikke tage Erycin[®], hvis du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Erycin[®] påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Erycin[®]

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletten synkes hel med rigelig væske umiddelbart før et måltid; tabletten må ikke deles eller knuses.

Voksne: 250 – 500 mg 2 – 4 gange dagligt. Dosis kan øges til 4 tabletter på 500 mg (i alt 2000 mg) 2 gange dagligt eller 2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 4 gange dagligt ved alvorlige infektioner.

Brug til børn

Børn (over 25 kg): 20 – 50 mg pr. kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 2 – 4 doser.

Dosis afhænger af barnets vægt og fastlægges af lægen.

Du kan ikke bruge Erycin[®] tabletter til børn under 25 kg, da dosis er for høj. Du kan i stedet bruge Erycin[®] pulver til oral suspension. Følg lægens anvisning.

Ældre (over 65 år)

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Selvom bedring opnås allerede efter få dage, er det vigtigt at fortsætte med at tage medicinen i hele den periode, lægen har angivet. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.

Hvis du har taget for meget Erycin[®]

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere af Erycin[®], end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Tegn på at du har taget for mange tabletter kan være mavegener med opkastning og smerter, gulsot og ømhed under højre ribbensbue (galdeophobning), forbigående tab af hørelsen, forstyrrelser i hjerterytmen.

Hvis du har glemt at tage Erycin[®]

Hvis du har glemt at tage en dosis Erycin[®], så tag den snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på tidspunktet for næste dosis, springes den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Mavesmerter, kvalme, opkastninger, diarré, appetitløshed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Forhøjede leverenzymtal (ved blodprøve), forhøjet galdefarvestof (ved blodprøve), udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Nældefeber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig overfølsomhedsreaktion med pludseligt udslæt, vejrtrækningsbesvær og eventuel besvimelse. Hjerterbanken, alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen, betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber (alvorlig), leverbetændelse (alvorlig), nedsat leverfunktion, midlertidigt høretab.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Epileptiske anfald (alvorlig), muskelkramper, alvorlige hudlidelser (betændelse i huden på hænder, fødder og omkring munden, kraftig afskalning af huden), alvorlig betændelse i tarmen (langvarig og blodig diarré med mavesmerter eller feber), hallucinationer, forvirring, alvorlig forværring af sygdommen myasthenia gravis (muskelsvaghed), irritabilitet hos nyfødte børn, forsnævring af maveporten hos spædbørn (ses ved voldsomme opkastninger).

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data, sandsynligvis sjælden):

Forhøjet antal af visse typer af hvide blodlegemer (eosinofili), allergiske reaktion (fra nældefeber og lettere hududslæt til alvorligere overfølsomhedsreaktioner). Døvhed. Lavt blodtryk. Leverbetændelse med blokerede galdeveje, gulsot, forstørret lever, leversvigt. Kløe, allergiske reaktioner med hævelser, der kan medføre vejrtræknings- og synkebesvær. Smerter i brystkassen, feber, utilpashed. Vrangforestillinger (hallucinationer). Nyrebetændelse, som kan give smerter over lænden, feber og blod i urinen.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved alvorlige bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Erycin[®] indeholder:

- Aktivt stof: erythromycin.
- Øvrige indholdsstoffer: diethylphthalat, hypromellose (E 464), hypromellosephthalat, gelatine, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), natriumstivelsesglycollat, propylenglycol (E 1520) og vandfri kolloid silica (E 551).
- Erycin[®] 500 mg indeholder desuden majsstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Erycin[®] 250 mg er en hvid, rund, filmovertrukket tablet.

Erycin[®] 500 mg er en hvid, aflang, filmovertrukket tablet.

Erycin[®] 250 mg: 24 og 100 enterotabletter

Erycin[®] 500 mg: 12, 20 og 100 enterotabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

Tlf.: +45 49 12 66 00

opdk@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 20. april 2015