

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

FEXOFENADIN ORIFARM Filmovertrukne tabletter 180 mg Fexofenadinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Fexofenadin Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fexofenadinhydrochlorid Orifarm
3. Sådan skal du tage Fexofenadin Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Virkemåde

- Fexofenadinhydrochlorid, det aktive stof i din medicin, tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes antihistaminer.

Medicinen anvendes til

- Fexofenadin Orifarm 180 mg tabletter anvendes for at lindre symptomer som rødme, kløe og hævelse af huden, som opstår i forbindelse med den type hudallergi, der kaldes kronisk idiopatisk urticaria (CIU).

Lægen kan have givet dig Fexofenadin Orifarm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FEXOFENADIN ORIFARM

Tag ikke Fexofenadin Orifarm:

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn under 12 år.

Vær ekstra forsigtig med at tage Fexofenadin Orifarm:

- hvis du er ældre.
- hvis du har nyre- eller leverproblemer.

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager dette lægemiddel.

Brug af anden medicin

Hvis du tager et middel mod mavebesvær, som indeholder aluminium eller magnesium, anbefales det, at du venter ca. 2 timer fra du har taget et sådant

lægemiddel til du tager Fexofenadin Orifarm. Midlet mod mavebesvær kan reducere den mængde af lægemiddel, der optages, og kan påvirke virkningen af Fexofenadin Orifarm.

Koncentrationen af fexofenadinhydrochlorid i blodet kan stige, hvis du tager fexofenadinhydrochlorid sammen med erythromycin eller ketoconazol eller sammen med en enkelt dosis af en kombination af lopinavir og ritonavir. Det er muligt, at bivirkningerne øges.

Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal brugen af dette lægemiddel ophøre tre dage før du testen skal foretages.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Fexofenadin Orifarm sammen med mad og drikke

Fexofenadin Orifarm skal tages med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Hvis du er gravid, må du kun tage Fexofenadin Orifarm efter aftale med lægen.

Amning: Hvis du ammer, må du ikke tage Fexofenadin Orifarm, da Fexofenadin går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Fexofenadin Orifarm påvirker din evne til at køre bil eller til at betjene maskiner. Der kan dog være sjældne undtagelser, så du skal sikre dig, at du er årvågen og klar, inden du kører bil eller udfører opgaver, som kræver din fulde koncentration.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FEXOFENADIN ORIFARM

Tag altid Fexofenadin Orifarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering:

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1 ½ dl).

Den sædvanlige dosis er 1 tablet én dag dagligt til voksne og børn på 12 år eller derover.

Hvis du føler, at virkningen af Fexofenadin Orifarm er for kraftig eller for svag, skal du rådføre dig med lægen eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Fexofenadin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fexofenadin Orifarm tabletter, end der er angivet i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering:

Blandt symptomerne på overdosering er svimmelhed, døsigthed, træthed og mundtørhed.

Hvis du har glemt at tage Fexofenadin Orifarm

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Fexofenadin Orifarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne, som er beskrevet herunder, forekommer hos patienter, der tager fexofenadin, og de er angivet som enten almindelige, ikke almindelige eller sjældne.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): hovedpine, døsigthed, kvalme, mundtørhed og svimmelhed.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): træthed, søvnløshed, nervøsitet, søvnforstyrrelser og mareridt.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): allergiske hudreaktioner såsom udslæt, nældefeber og kløe, uventede hævelser (ødem) trykken for brystet, kortåndethed og rødmen.

Hvis der opstår symptomer på anafylaktiske reaktioner (for eksempel hævelse eller åndedrætsbesvær) eller alvorlige hudreaktioner, skal du søge læge.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Tag ikke Fexofenadin Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fexofenadin Orifarm 180 mg filmovertrukne tabletter:

Aktivt stof: fexofenadinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrySTALLinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse, povidon og magnesiumstearat. Tablettens filmovertræk indeholder hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogoler og jernoxid, gul (E172).

Fexofenadin Orifarm udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Fexofenadin Orifarm 180 mg tabletter er gule ovale filmovertrukne tabletter, der er glatte på den ene side og med en delekærv på midten på den anden side.

Pakningstørrelser:

Fexofenadin Orifarm fås i pakningsstørrelser med 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 eller 200 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Mail: info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DK	Fexofenadin Orifarm
NO	Fexofenadin Copyfarm
SE	Fexofenadin Orifarm
FI	Fexofenadinhydrochlorid Copyfarm
DE	Fexofenaderm 180 mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

08/2011

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk.