

Anastrozol Arrow 1 mg filmovertrukne tabletter

Anastrozol

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Anastrozol Arrow til dig personligt. Lad derfor være med at give Anastrozol Arrow til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Översigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anastrozol Arrow
3. Sådan skal du tage Anastrozol Arrow
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Anastrozol Arrow indeholder et stof, der hedder anastrozol. Det tilhører den gruppe lægemidler, der kaldes aromatasehæmmere. Anastrozol Arrow anvendes til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret overgangsalderen.

Anastrozol Arrow fungerer ved at nedsætte mængden af hormonet østrogen, som din krop producerer. Det sker ved at blokere et naturligt stof (et enzym) i din krop, som hedder "aromatase". Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ANASTROZOL ARROW

Tag ikke Anastrozol Arrow

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for anastrozol eller ét af de øvrige indholdsstoffer i Anastrozol Arrow (se pkt. 6: Yderligere oplysninger).
- hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet "Graviditet og amning").

Tag ikke Anastrozol Arrow, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen eller på apoteket, inden du tager Anastrozol Arrow, hvis du er i tvivl.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Vær ekstra forsigtig med at tage Anastrozol Arrow

- Inden du tager Anastrozol Arrow, skal du spørge din læge eller på apoteket
- hvis du har menstruation og ikke har overstået overgangsalderen.
 - hvis du tager et lægemiddel, som indeholder tamoxifen, eller lægemidler, der indeholder østrogen (se afsnittet "Brug af anden medicin").
 - hvis du nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af dine knogler (knogleskørhed, osteoporose).
 - hvis du har problemer med leveren eller nyrerne.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller spørge på apoteket, før du tager Anastrozol Arrow.

Hvis du bliver indlagt på hospitalet, bør du meddele personalet, at du tager anastrozol.

Brug af anden medicin

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept samt naturlægemidler. Det skyldes, at Anastrozol Arrow kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan påvirke Anastrozol Arrow.

Tag ikke Anastrozol Arrow, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler:

- Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor-modulatorer), f.eks. lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler kan forhindre Anastrozol Arrow i at virke optimalt.
 - Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonstatningsterapi (HRT).
- Hvis det er tilfældet for dig, skal du spørge din læge eller apoteket til råds.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager følgende:

- Medicin, som kaldes "LHRH-analoger". Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse gynækologiske sygdomme og infertilitet.

Graviditet og amning

Tag ikke Anastrozol Arrow, hvis du er gravid eller ammer. Stop med at tage Anastrozol Arrow, hvis du bliver gravid, og tal med din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastrozol Arrow vil påvirke evnen til at føre motorkøretøjer, arbejde med værktøj eller betjene maskiner. Nogle mennesker vil dog af og til føle sig trætte eller søvnige, når de tager Anastrozol. Hvis det sker for dig, skal du spørge din læge eller apoteket til råds.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Anastrozol Arrow

Anastrozol Arrow indeholder lactose, der er en form for sukker. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager denne medicin.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ANASTROZOL ARROW

Tag altid Anastrozol Arrow nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

- Den sædvanlige dosis er en tablet dagligt.
- Prøv at tage din tablet på samme tidspunkt hver dag.
- Slug tabletten hel med et glas vand.
- Det er lige meget, om du tager Anastrozol før, under eller efter et måltid.

Fortsæt med at tage Anastrozol, så længe din læge siger det. Det er en langvarig behandling, og du skal muligvis tage det i flere år.

Brug til børn

Anastrozol Arrow må ikke gives til børn og unge.

Hvis du har taget for mange Anastrozol Arrow tabletter

Hvis du har taget for mange Anastrozol Arrow, skal du straks kontakte læge.

Hvis du har glemt at tage Anastrozol Arrow

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Anastrozol Arrow

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne, medmindre det er aftalt med din læge.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Anastrozol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (ses hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

- Hovedpine.
- Hævelse.
- Kvalme.
- Hududslæt.
- Smerte eller stivhed i leddene.
- Betændelse i leddene (artrit).
- Mæthed.
- Knogleskørhed (osteoporose).

Almindelige bivirkninger (ses hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Appetitløshed.
- For høje niveauer af kolesterol (fedt) i blodet. Dette ville fremgå af en blodprøve.
- Døsighed.
- Karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kuldeformemmelse, svaghed i dele af hånden).
- Diarré.
- Opkastning.
- Ændringer i blodprøver, der viser, hvor godt din lever fungerer.
- Udtynding af håret (hårtab).
- Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen.
- Knoglesmerter.
- Tørhed i skeden.
- Blødning fra skeden (sædvanligvis kun under de første få ugers behandling – hvis blødningen fortsætter, skal du kontakte din læge).

Ikke almindelige bivirkninger (ses hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

- Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer (gamma-GT og bilirubin).
- Leverbetændelse (hepatitis)
- Udslæt eller nældefeber
- Springfinger (en tilstand i hvilken en finger, oftest tommelfingeren, låses fast i en bøjet stilling)

Sjældne bivirkninger (påvirker mellem 1 og 10 personer ud af 10.000)

- Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer.
- Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (som kan skyldes en allergisk eller allergilignende reaktion).
- Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolent udslæt på huden. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes 'Schönlein-Henoch purpura'.

Meget sjældne bivirkninger (påvirker færre end 1 person ud af 10.000)

- En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes 'Stevens-Johnsons syndrom'.
- Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at sluge eller trække vejret. Dette kaldes 'angioødem'.

Hvis du får en af disse bivirkninger, skal du straks tilkalde en ambulance eller søge læge – du skal muligvis behandles med det samme.

Indvirkning på dine knogler - knogleskørhed

Anastrozol Arrow sænker mængden af hormonet østrogen i din krop. Dette kan sænke indholdet af mineraler i dine knogler. Dine knogler kan blive svagere, og du kan have større risiko for knoglebrud. Din læge vil afveje disse risici i henhold til retningslinjerne for behandling af knogleskørhed hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. Det anbefales, at du taler med din læge om risici og behandlingsmuligheder.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

Der er ingen særlige opbevaringskrav til dette lægemiddel.

Opbevares utilgængeligt for børn. Tabletterne skal opbevares på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Dine tabletter kan skade børn.

Brug ikke Anastrozol Arrow efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "Udl.dat.:".

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anastrozol Arrow indeholder:

- Aktivt stof: Anastrozol. Hver fillovertrukket tablet indeholder 1 mg anastrozol.
- Øvrige indholdsstoffer:
Tabletkernen: Lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat type A, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat, talcum.
Fillovertræk: hypromellose, macrogol 400 og titandioxid (E171), talcum.

Udseende og pakningsstørrelse

Anastrozol Arrow er en hvid, rund tablet, der er fillovertrukket.

Anastrozol Arrow findes i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 fillovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Arrow Generics Limited,
Unit 2, Eastman Way, Stevenage,
Hertfordshire, SG1 4SZ
Storbritannien

Fremstiller:

Remedica Ltd
Limassol Industrial Estate
Aharon Street
PO Box 51706
3508 Limassol
Cypern

Dansk repræsentant
Arrow Pharma ApS,
Sankt Peders Stræde 2, 1.,
4000 Roskilde

Dette lægemiddel er godkendt i EEA-medlemslandene under følgende navne:

Belgien: Anastrozole 1 mg Arrow Generics, filmomhulde tabletten
Cypern: Anastrozole Arrow 1 mg film-coated tablets
Tjekkiet: Anastrozol Arrow 1 mg potahovaná tableta
Tyskland: Anastrozol Q 1 mg Filmtabletten
Danmark: Anastrozol Arrow 1 mg fillovertrukne tabletter
Spanien: Anastrozole Arrow 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Frankrig: Anastrozole Arrow 1 mg, comprimé pelliculé
Irland: AnastArrow 1 mg film-coated tablets
Italien: Anastrozolo Arrow 1 mg compresse rivestite con film
Malta: Anastrozole 1 mg film-coated tablets
Holland: Anastrozole Arrow 1 mg filmomhulde tablet
Norge: Anastrozol Arrow 1 mg, filmdrasjerte tabletter
Polen: Anastrozole Arrow 1 mg tabletki powlekane
Portugal: Anastrozol arrowblue 1 mg comprimido revestido por película
Sverige: Anastrozol Arrow 1 mg, filmdragerade tabletter
Slovenien: Anastrozole Arrow 1 mg filmsko obložene tablete
Slovakiet: Anastrozole Arrow 1 mg filmom obalené tablety
Storbritannien: Anastrozole 1 mg film-coated tablets

Denne indlægsseddel er senest revideret maj 2012