

INDLÆGSSEDDEL

Trimazin Forte Vet., granulat til føl, kalve og svin

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Scanpharm A/S
Topstykket 12
Birkerød

Repræsentant:

ScanVet Animal Health A/S
Kongevejen 66
DK-3480 Fredensborg

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Trimazin Forte Vet., granulat til føl, kalve og svin

Sulfadiazin/trimethoprim

3. ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 g indeholder:

Aktivt stof

Sulfadiazin	200 mg
Trimethoprim	40 mg

Hjælpstof

Præparatet indeholder natrium laurilsulfat, natrium alginat, povidon, simethicon emulsion, lactose.

4. INDIKATIONER

Infektioner forårsaget af sulfonamid-/trimetoprimfølsomme mikroorganismer hos føl, kalve og svin.

5. KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til heste behandlet med Domosedan[®] vet. (detomidin NFN), se pkt. 12.
Nedsat lever- og nyrefunktion, se pkt. 12.

6. BIVIRKNINGER

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

<http://www.lmst.dk>

7. DYREARTER

Føl. Kalve. Svin.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej(E)

30 mg aktivt stof pr. kg legemsvægt i 2-5 dage, svarende til 5 g granulat per 40 kg legemsvægt. Døgndosis kan fordeles på 2 behandlinger.

Granulatet iblandes foderet eller opslemmes i en lille mængde mælk/vand, som herefter indgives med flaske.

Granulatet er smagsneutralt.

Vedlagte ske rummer 5 g granulat.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Granulatet.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: 15 døgn.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato der står på etiketten efter 'Anv. før'.

I salgpakning: 4 år.

12. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Bør ikke gives til drøvtyggere med fuldt udviklet vomfunktion, og bør derfor ikke gives til kalve over 2 måneder.

Særlige forsigtighedsregler for dyret:

Hos nyfødte dyr samt dyr med nedsat lever- og nyrefunktion kan dosering over længere tid medføre akkumulation af TMP/sulfadiazin og metabolitter.

Bør ikke gives til drøvtyggende dyr.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Trimetoprim-/sulfonamidholdige præparater kan udløse fatale, cardiale arytmier hos detomidinsederede heste.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

November 2015

15. ANDRE OPLYSNINGER

Pakningsstørrelser:

250 g i alusæk.

5000 g i alusæk eller plastspand med låg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.