

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Erdotin 300 mg hårde kapsler

Erdosteine

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Erdotin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Erdotin
3. Sådan skal du tage Erdotin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Erdotin indeholder erdosteine, et slimløsende stof, der virker på slimhinderne i luftrøret eller luftvejene.

Anvendelse:

Erdotin anvendes til behandling af symptomer i forbindelse med korte, alvorlige perioder med forværring af kronisk bronkitis hos voksne. Det anvendes ligeledes som slimløsende middel.

Lægen kan have givet dig Erdotin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE ERDOTIN

Tag ikke tage Erdotin

- hvis du er allergisk (overfølsom) over for erdosteine eller et af de øvrige indholdsstoffer i Erdotin
- hvis du har alvorlig leversvigt
- hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion
- hvis du har mavesår.

Vær ekstra forsigtig med at tage Erdotin

- hvis du har let leversvigt, må du kun tage 1 kapsel dagligt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Erdotin påvirker sædvanligvis ikke andre lægemidler.

Brug af Erdotin sammen med mad og drikkevarer

Mad og drikkevarer har ingen indflydelse på Erdotin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Erdotin efter aftale med lægen..

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Erdotin efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Erdotin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ERDOTIN

Tag altid Erdotin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.

Den normale dosis er:

Ældre patienter og voksne over 18 år:

1 kapsel (300 mg erdosteine) 2 gange dagligt.

Den maksimale behandlingsvarighed er 10 dage.

Hvis du har tagetfor mange Erdotin hårde kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Erdotin hårde kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemtat tage Erdotin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Erdotin

Spørg din læge eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Erdotin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Færre end 1 ud af 1.000 patienter kan forvente at få bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- hovedpine
- forkølelse og åndedrætsbesvær
- smagsforandringer, kvalme, opkastning, mavesmerter (halsbrand) og diarré
- kløe, hudrødme samt hudeksem.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her..

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Erdotin efter den udløbsdatoen, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den pågældende måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvad Erdotin 300 mg hårde kapsler indeholder

- Aktivt stof: erdostein.
- Øvrige indholdsstoffer: mikrokrySTALLinsk cellulose, povidon, magnesiumstearat.
Kapselskallen indeholder: gelatine, titandioxid (E171), gult jernoxid (E172) og indigotin (E132).

Produktets udseende og pakningsstørrelse

Erdotin er en kapsel, som består af en grøn overdel og en gul underdel, og den er pakket i PVC/PVdC/aluminium blisterpakninger.

Pakningsstørrelser: 20 og 60 hårde kapsler

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Edmond Pharma S.r.l.

Via G.B. Grassi 15

20157 Milano

Italien

tlf: +39 023320781

fax: +39 023570027

Dansk repræsentant:

Orion Pharma A/S,

Møllevej 9A,

2900 Nivå

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Erdotin

Storbritannien: Erdotin

Irland: Erdotin

Denne indlægsseddel blev sidst revideret den 29 oktober 2010

Erdotin er et beskyttet varemærke