

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Natriumchlorid Noridem **solvens til parenteral anvendelse/injektionsvæske, opløsning 9 mg/ml**

Natriumchlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Natriumchlorid Noridem til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Natriumchlorid Noridem
3. Sådan bliver du behandlet med Natriumchlorid Noridem
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Natriumchlorid Noridem er en type medicin, som kaldes en elektrolyt. Det er en steril salt-opløsning, der minder meget om kropsvæskerne.

Hovedanvendelsen for Natriumchlorid Noridem er at opløse eller fortynde andre lægemidler, så de kan gives som en injektion eller en infusion (et drop) i årer, muskler eller andre vævstyper i kroppen. Natriumchlorid Noridem kan også anvendes til en række forskellige kirurgiske og medicinske forberedelser:

- Rensning af katetre (små anordninger der stikkes ind i årene for at injicere medicinen)
- Som en spædningsopløsning for at fylde intravenøse tuber (lange tuber, der sættes til dine blodårer). Det er for at sikre, at der ikke injiceres luft, for eksempel under hæmodialyse (en fremgangsmåde til at rense blod ved nyresygdomme)
- Som en spædningsopløsning i begyndelsen og i slutningen af blodtransfusioner for at undgå beskadigede blodlegemer.

Natriumchlorid Noridem kan også tilsættes andre medikintyper ved infusioner (drop), for eksempel sukkeropløsninger. I dette tilfælde fungerer Natriumchlorid Noridem som en elektrolyt for at hjælpe med til at stabilisere vandniveauet i kroppen.

Lægen kan give dig Natriumchlorid Noridem for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE OM NATRIUMCHLORID NORIDEM

Du må ikke få Natriumchlorid Noridem

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du lider af unormalt højt indhold af natrium i blodet (hypernatriæmi).
- hvis du lider af unormalt højt indhold af klorid i blodet (hyperkloremi).

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Natriumchlorid Noridem

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet inden behandlingen, hvis

- du har hjerteproblemer.
- du har problemer med blodtrykket.
- du har nyreproblemer.
- du har for meget natrium i kroppen.

Sørg for at læse indlægssedlerne for al din medicin. Nogle gang bruges Natriumchlorid Noridem nemlig til at opløse eller fortynde anden medicin.

Brud af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin, eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Hvis du tager noget af følgende medicin er det meget vigtigt, at du fortæller det til lægen:

- korticosteroider, såsom kortison, hydrocortison, prednison, prednisolon, betamethason

.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Natriumchlorid er ikke kendt for at give problemer under graviditeten eller i ammeperioden.

Da Natriumchlorid somme tider gives sammen med anden medicin, er det vigtigt at fortælle lægen eller sundhedspersonalet:

- hvis du er gravid, eller tror at du måske er gravid.
- hvis du ammer.

Lægen vil beslutte, om du skal have denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumchlorid Noridem påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED NATRIUMCHLORID NORIDEM

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Læs venligst den anden side af denne indlægsseddel.

Du vil normalt få Natriumchlorid Noridem af en læge eller sygeplejerske.

Dosis bliver bestemt af lægen eller sundhedspersonalet på baggrund af din sygdom.

Dosis vil afhænge af behandlingens formål og om Natriumchlorid Noridem bliver anvendt til indgivelse eller til opløsning eller fortynding af en anden medicin.

Hvis du har fået for meget Natriumchlorid Noridem solvens til parenteral anvendelse/injektionsvæske, opløsning

Du vil normalt få Natriumchlorid Noridem af en læge eller sygeplejerske. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Natriumchlorid Noridem.

Eftersom Natriumchlorid Noridem udleveres i små mængder (maksimum 20 ml pr. beholder), er det ikke sandsynligt, at du vil få for meget.

Natriumchlorid Noridem gives somme tider sammen med anden medicin, så sørg for at læse indlægssedlerne for al din medicin.

Hvis en dosis er glemt

Du vil normalt få Natriumchlorid Noridem af en læge eller sygeplejerske. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du ikke har fået Natriumchlorid Noridem.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Natriumchlorid Noridem kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Den gavnlige effekt af din medicin vil som regel være større end risikoen for bivirkninger.

De kendte bivirkninger ved Natriumchlorid Noridem, når det anvendes til opløsning og fortynding af andre lægemidler eller som spædningsopløsning, er for meget natrium i blodet og for meget klorid i blodet.

Husk at du også kan få bivirkninger af den medicin, som Natriumchlorid Noridem opløser eller fortynder. Sørg for at læse indlægssedlerne for al din medicin.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Natriumchlorid Noridem efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten på plastikbeholderen (ampullen). Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Natriumchlorid Noridem ved temperaturer over 25⁰ C.

Brug kun medicinen hvis det er en klar, farveløs væske. Anvendes umiddelbart efter åbning.

Overskydende medicin bortskaffes.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Natriumchlorid Noridem solvens til parenteral anvendelse/injektionsvæske, opløsning 9mg/ml indeholder:

- Aktivt stof: natriumchlorid: 9 mg pr.ml.
- Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker.

Denne medicin indeholder 0,9 % w/v (9 mg pr. ml) natriumchlorid.

Udseende og pakningsstørrelser:

Natriumchlorid Noridem er en klar, farveløs væske.

Pakningsstørrelser:

Hver plastikampul indeholder 5 ml (milliliter), 10 ml eller 20 ml Natriumchlorid Noridem.

5 ml x 50 ampuller
10 ml x 50 ampuller
20 ml x 20 ampuller

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Noridem Enterprises Limited
Evagorou & Makariou
Mitsi Bygning 3, væ..115
1065 Nicosia
Cypern.

Repræsentant for Danmark:

Abcur AB
Campus Gräsvik 5
371 75 Karlskrona
Sverige

Fremstiller:

Demo S.A. 21st km
National Road Athens-Lamia
14568 Athen
Grækenland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 7. oktober 2010.