

Article No	Replace	Dimension	Colours	Material	Designed by	Date	Proof No
434-934	-	297x105 mm	PMS Svart	45 g matt postpapper Falsas till ca 37x105 mm	Christer Larsson Phone: +46 8 56643355	05-04-27	1

Albuminativ 40 g/l

Humant albumin 40 g/l



434-934

434-934

octapharma

Indlægsseddel

Læs hele denne information omhyggelig før du begynder at tage medicinen.

- Gem denne information. Du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Albuminativ 40 g/l til dig personligt. Giv den derfor ikke til andre. Det kan skade dem, selv om deres symptomer er de samme som dine.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som skal læses, før du bruger Albuminativ 40 g/l
3. Sådan skal du tage Albuminativ 40 g/l
4. Mulige bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

Albuminativ 40 g/l indeholder:

Albuminativ 40 g/l infusionsvæske, opløsning
Humant albumin udvundet af humant blod.
Hjælpstofferne er: Natriumcaprylat, natriumchlorid, natriumhydroxid eller saltsyre, kalium og vand til injektionsvæsker.

Markedsføres i Danmark af:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Octapharma AB, 112 75 Stockholm, Sverige

Fremstillere: Octapharma

Dansk repræsentant:
Octapharma Nordic AB, Næsseslottet, Dronningsgårds Allé 138, 2840 Holte

1. Virkning og anvendelse

Albuminativ 40 g/l er en opløsning til infusion i en vene og findes i 500 ml infusions flasker.
Det tilhører den farmakoterapeutiske gruppe: Plasma erstatning og plasma proteinfraktioner.
Produktet gives til patienter for at genoprette og vedligeholde kredsløbs-blodvolumen, hvor der er påvist en mangel i dette volumen.

2. Vigtig information som skal læses før du tager Albuminativ 40 g/l

Hvis du udvikler en allergisk reaktion over for denne albumin behandling, vil infusionen blive afbrudt og lægen vil anbefale en anden behandling.

Dette produkt indeholder natrium og kalium og kan være skadelig for personer på lav natrium eller kalium diæt. Fortæl lægen, hvis du er på en sådan diæt.

Produktet kan anvendes til nyfødte børn og patienter i dialyse.

• Tag ikke Albuminativ 40 g/l:

- Hvis du er overfølsom over for albuminholdige produkter eller nogle af de øvrige hjælpestoffer i produktet.

• Særlige forholdsregler

- Hvis du er i særlig risikogruppe for øget blodvolumen, f.eks. ved visse hjerteforhold, højt blodtryk, væske i lungerne, koagulationsforstyrrelser, lavt tal af røde blodplader eller ingen urin.
- Ved er tegn på øget blodvolumen f.eks.hovedpine, åndedræts forstyrrelser, halsvene kongestion (fremtræden halsvene), forhøjet blodtryk, bør infusionen standses øjeblikkeligt.

• Graviditet

Humant albumin findes naturligt i humant blod. Der kendes ingen skadelige virkninger efter brug af dette produkt under graviditet. Der bør udvises særlig hensyn for at justere blodvolumenet hos gravide.



Article No	Replace	Dimension	Colours	Material	Designed by	Date	Proof No
434-934	-	297x105 mm	PMS Svart 	45 g matt postpapper Falsas till ca 37x105 mm	Christer Larsson Phone: +46 8 56643351	05-04-27	1

2:2



• **Amning**

Humant albumin findes naturligt i humant blod. Der kendes ingen skadelige virkninger efter brug af dette produkt under amning.

• **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Der er ikke noget der tyder på, at humant albumin påvirker evnen til at færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

• **Brug af anden medicin**

Indtil nu kendes ingen vekselvirkning med andre produkter. Albuminativ 40 g/l bør dog ikke blandes i samme indsprøjtning med andre lægemidler, fuldblod eller pakkede røde blodplader.

3. Hvordan skal du tage Albuminativ 40 g/l

• **Dosering**

Albuminativ 40 g/l er klar til brug til infusion (inddrypning) i en vene. Dosering og infusionshastighed (hvor hurtigt albuminet kommer ind i venen) afhænger af din særlige situation. Lægen afgør hvilken behandling, der er bedst for dig.

• **Har du taget for meget Albuminativ 40 g/l**

Hvis dosering og infusionshastighed er for høj, kan du udvikle hovedpine, højt blodtryk og ubehagelig vejrtrækning.

4. Mulige bivirkninger

Som ved al anden medicin kan Albuminativ 40 g/l give bivirkninger. Bivirkninger efter infusion af humant albumin er sjældne (mellem 1 ud af 1000 og 1 ud af 10.000). Du vil måske opleve et for lavt blodtryk, rødme, kløe, feber eller kvalme- som normalt forsvinder når infusionshastigheden sættes ned eller infusionen standses. Fortæl lægen hvis du får andre bivirkninger end beskrevet her i informationen.

Når du får lægemidler, som er fremstillet af humant blod eller plasma, kan infektioner, som følge af overførslen af smitstoffer, ikke helt udelukkes. Dette gælder også sygdomsfremkaldende stoffer af indtil i dag kendt eller ukendt natur.

For at mindske risikoen for overførsel af smitte foregår udvælgelsen af donorer og donationer under udførelse af passende målinger. Plasma pools analyseres og fjernelses eller inaktiverings procedurer er del af fremstillingen.

5. Opbevaring

- Opbevar og transporter ikke ved temperaturer over 25°C.
 - Opbevares i original karton, da lægemidlet er følsomt over for lys.
 - Må ikke fryses
 - Anvend ikke Albuminativ 40 g/l efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.
 - Produktet bør opvarmes til stue - eller kropstemperatur inden brugen.
 - Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opløsningen bør være klar eller svagt opal. Anvend ikke opløsninger, som er uklare eller har bundfald.
- Indholdet skal bruges umiddelbart efter at beholderen er åbnet. Enhver rest af produktet skal kasseres i overensstemmelse med de retningslinier, der gælder der, hvor du har fået din medicin.

Revideret juli/2003