



## FORBRUGERINFORMATION


**LORATADIN STADA**  
**Tabletter 10 mg**

G520022-3

**Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen.**

- De kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal De altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.

**I denne information er der oplysninger om:**

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Loratadin Stada.
3. Sådan skal De bruge Loratadin Stada.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

**1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Loratadin Stada 10 mg tabletter er hvide, runde tabletter med delekærv.

Loratadin Stada indeholder et stof (antihistamin) som lindrer symptomerne ved overfølsomheds sygdomme som høfeber, allergisk forkølelse og kronisk nældefeber.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

**2. VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL LÆSE, FØR DE BRUGER LORATADIN STADA**

- **Brug ikke Loratadin Stada hvis:**
  - De er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Loratadin Stada.
- **Særlige forholdsregler**
  - Hvis De har en leversygdom, skal De tale med Deres læge, inden De tager Loratadin Stada.
  - Hvis De skal have lavet en hudprøvetest (allergitest), skal De ikke bruge Loratadin Stada i mindst 48 timer inden testen.


**• Brug af Loratadin Stada sammen med mad og drikkevarer**

De kan tage Loratadin Stada sammen med mad og drikke.

**• Vigtige informationer om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Loratadin Stada**

Loratadin Stada tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

**• Graviditet og amning**

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin.

**Graviditet:**

De må ikke bruge Loratadin Stada, hvis De er gravid.

**Amning:**

De må ikke bruge Loratadin Stada, hvis De ammer. Loratadin bliver udskilt i modermælken.

**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Loratadin Stada kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

**• Brug af anden medicin**

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

**3. SÅDAN SKAL DE BRUGE LORATADIN STADA**
**Dosering:**

*Voksne og børn over 12 år:*  
1 tablet (10 mg) 1 gang dagligt.

*Børn 2 til 12 år med en vægt over 30 kg:*  
1 tablet (10 mg) 1 gang dagligt.

Brug ikke Loratadin Stada tabletter til børn med en vægt under 30 kg.

De må ikke bruge Loratadin Stada til børn under 2 år.





• **Har De brugt for meget Loratadin Stada?**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Loratadin Stada, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Symptomer på overdosering kan være træthed, hurtig hjertebanken eller hovedpine.

• **Har De glemt at bruge Loratadin Stada?**

Hvis De har glemt at tage Deres dosis til tiden, tag den næste dosis som Deres læge har fortalt Dem. De må ikke tage dobbeltdosis.

#### 4. BIVIRKNINGER

Loratadin Stada kan som al anden medicin give bivirkninger.

• **Alvorlige bivirkninger:**

**Meget sjældne bivirkninger** (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  
Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112.

• **Ikke alvorlige bivirkninger:**

**Almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  
Hovedpine, nervøsitet, træthed, døsighed.

**Ikke almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  
Øget appetit og søvnbesvær.

• **Meget sjældne bivirkninger** (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  
Svimmelhed, kvalme, hjertebanken, hurtig puls, mundtørhed, maveproblemer, hårtab, udslæt og unormal leverfunktion.

Fortæl Deres læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl Deres læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:  
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

#### 5. OPBEVARING

- Opbevar Loratadin Stada utilgængeligt for børn.
- Anvend ikke Loratadin Stada efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

#### 6. YDERLIGERE INFORMATION

**Loratadin Stada indeholder:**

Loratadin Stada, tabletter, 10 mg

Det aktive stof i Loratadin Stada er loratadin.

De øvrige indholdsstoffer er: Lactosemonohydrat; mikrokrySTALLINSK cellulose; majsstivelse og magnesiumstearat.

**Markedsføring i Danmark:**

STADA Arzneimittel AG,  
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland.

**Dansk repræsentant:**

PharmaCoDane ApS,  
Marielundvej 46 A, 2730 Herlev.

**Fremstiller:**

STADA Arzneimittel AG,  
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland.

Afllever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret april 2005



  
**PharmaCoDane**

PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev

9210025 0606

