



33970-01-02

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN PARACETAMOL ORIFARM

Tabletter 500 mg
Paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Paracetamol Orifarm uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Paracetamol Orifarm

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paracetamol Orifarm
3. Sådan skal du tage Paracetamol Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Paracetamol Orifarm er et smertestillende lægemiddel og bruges til lindring af svage smerter. Paracetamol Orifarm virker febernedsættende.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Paracetamol Orifarm for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paracetamol Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Paracetamol Orifarm

- hvis du er overfølsom over for paracetamol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har svært nedsat leverfunktion

Vær ekstra forsigtig med at tage Paracetamol Orifarm

Paracetamol Orifarm bør anvendes med forsigtighed af personer med

- Nedsat leverfunktion
- Kronisk alkoholisme
- Stærkt nedsat nyrefunktion

I tilfælde af høj feber, tegn på infektion eller vedvarende symptomer ud over 3 dage bør lægen kontaktes.

Overskrides den anbefalede dosis kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

Langtidsbehandling og vanemæssigt brug af smertestillende lægemidler kan give hovedpine og nyreskader.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Paracetamol Orifarm. Det kan have betydning for resultaterne

Brug af anden medicin

Hvis flere lægemidler anvendes samtidig, kan de påvirke effekten af hinanden. Kontakt lægen, hvis du

anvender et af følgende lægemidler samtidig med Paracetamol Orifarm, da dosis eventuelt skal justeres:

- Probenecid (middel mod urinsur gigt)
- Salicylamid (middel mod smerter)
- Metochlopramid og Domperidon (midler mod opkastning)
- Cholestyramid (middel mod forhøjet kolesterol)

Hvis Paracetamol Orifarm tages gentagne gange i mere end 7 dage, kan det øge virkningen af blodfortyndende lægemidler.

Paracetamol Orifarm bør anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler, som påvirker leverens funktion eller som er kendt for at være skadelig for leveren. For at undgå overdosering bør det kontrolleres at lægemidler, der bruges samtidig med Paracetamol Orifarm, ikke også indeholder paracetamol.

Følgende lægemidler kan øge risikoen for leverpåvirkning ved nedbrydning af paracetamol:

- Carbamazepin (middel mod epilepsi)
- Diflunisal (smertestillende middel, NSAID)
- Alkohol

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Paracetamol Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Paracetamol Orifarm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan tage Paracetamol Orifarm under graviditet.

Amning:

Du kan tage Paracetamol Orifarm selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paracetamol Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Paracetamol Orifarm

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Voksne: 2 tabletter (1000 mg) 3-4 gange i døgnet, højst 8 tabletter i døgnet. I nogle tilfælde er 1 tablet (500 mg) 3-4 gange i døgnet tilstrækkeligt.

Børn: Den anbefalede daglige dosis er op til 45 mg paracetamol pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser (se skemaet nedenfor).

Legemsvægt	Alder	Dosering
17-25 kg	4-7 år	1/2 tablet (250 mg) 3 gange i døgnet
25-40 kg	7-12 år	1/2-1 tablet (250 - 500 mg) 3 gange i døgnet
Over 40 kg	ca. 12 år	1-2 tabletter (500-1000 mg) 3 gange i døgnet

Du må kun bruge Paracetamol Orifarm til børn under 4 år efter aftale med en læge.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er her nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Paracetamol Orifarm tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Paracetamol Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Symptomer:

- Kvalme
- Opkastning
- Appetitløshed
- Blegthed
- Mavesmerter

Hvis du har glemt at tage Paracetamol Orifarm

Hvis du har glemt at tage en dosis Paracetamol Orifarm kan du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis det er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Paracetamol Orifarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Påvirkning af leveren, som kan være alvorlig.
- Udslæt, nældefeber, afgrænset medikamentelt udslæt (fixed drug eruption).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt og nældefeber. I alvorlige tilfælde allergisk chok (pludselige overfølsomhedsreaktioner, inden for minutter til timer med f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse). Ring 112 (kan være livsnødvendigt).

Ved langtidsbehandling er der risiko for nyreskade.

Der er i isolerede tilfælde set forstyrrelse i blodets evne til at størkne samt ændringer i blodbilledet

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted, www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Paracetamol Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Paracetamol Orifarm indeholder:

- Aktivt stof: Paracetamol
- Øvrige indholdsstoffer: Stivelse pregelatineret og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Paracetamol er en hvid oval tablet med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

Blister: 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 29, 30, 48, 49, 50, 56, 84, 96, 98, 99, 100, 105, 196, 200, 203, 294, 300, 301, 500 stk.

Enkelt dosis blister: 48, 49, 50, 56, 98, 100, 102 stk.

Botter: 50, 100, 200, 250, 300

Det er ikke sikkert at alle pakningsstørrelser markedsføres.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S
Mail: info@Orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11.2009



339700102