

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

DIPROSALIC® 0,5mg/g + 20mg/g kutanopløsning Betamethason/salicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Diprosalic® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprosalic®.
3. Sådan skal du bruge Diprosalic®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Diprosalic® kutanopløsning indeholder et stærkt binyrebarkhormon og salicylsyre.
- Diprosalic® virker ved at salicylsyren blødgør huden og binyrebarkhormonet dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved bliver udbredelsen af udslett, eksem eller psoriasis mindre.
- Du kan bruge Diprosalic® til behandling af forskellige former for eksem samt psoriasis.

Lægen kan have givet dig Diprosalic® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprosalic®

Brug ikke Diprosalic®

- hvis du er overfølsom over for betamethason eller salicylsyre, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen også bliver behandlet.
- hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på næsen, kinderne og i panden (rosacea).
- hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- på bumser eller på områder med bumser.
- hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelssår, skoldkopper og helvedesild).
- til hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diprosalic®

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
- Du bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Hvis huden bliver mere tør, irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- Du må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster.
- Du bør ikke bruge Diprosalic® på åbne sår eller beskadiget hud.
- Du bør ikke bruge Diprosalic® rundt om øjnene.
- Undgå at få Diprosalic® i øjnene.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis du har brugt Diprosalic® i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diprosalic® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diprosalic®, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diprosalic®.

Brug af anden medicin

Du kan bruge Diprosalic® sammen med anden medicin.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Diprosalic® efter aftale med lægen.

Amning:

- Du kan bruge Diprosalic® i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen.
- Du bør ikke bruge Diprosalic® på brystet mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diprosalic® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Diprosalic®

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn:

Påsmør et tyndt lag 1-2 gange daglig, morgen og aften. Dryp nogle få dråber Diprosalic® kutanopløsning på det berørte område, og massér forsigtigt kutanopløsningen godt ind i huden. Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med færre påsmøringer. Undgå at få Diprosalic® i øjnene. Vask hænder efter påsmøring, med mindre du skal behandle hænderne.

Brug altid Diprosalic® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har brugt for meget Diprosalic®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diprosalic®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis du har glemt at bruge Diprosalic®

Påsmør et tyndt lag Diprosalic® kutanopløsning så hurtigt som muligt og følg derefter lægens anvisning.

Hvis du holder op med at bruge Diprosalic®

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Hvis du har brugt Diprosalic® i længere tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom nedtrapning af behandlingen.

4. Bivirkninger

Diprosalic® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

- Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Ny betændelse på det behandlede område.
- Tynd, skrøbelig hud, strækmærker, rødme lokaliseret til hage og næse (steroid-rosacea), små punktformede eller større blødninger i huden.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

- Uønsket hårvækst, hvide eller brune pletter på huden (pigmentforandringer).

Hyppigheden er ikke kendt:

- Følelse af smerte.
- Betændelse i hårsække, små væskefyldte blærer (miliaria), udslæt med bumser.
- Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
- Kløe, brænden, irritation, tør hud, revner ved mundvige, smerte ved det behandlede område.
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), udslæt, udvidning af de små blodkar i huden, opblødt og læset hud.
- Allergisk kontakteksem.
- Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Diprosalic® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Diprosalic® ved temperaturer over 25 °C.
- Brug ikke Diprosalic® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Diprosalic®, 0,5 mg/g + 20 mg/g, kutanopløsning indeholder:

Betamethasondipropionat, svarende til betamethason 0,5 mg/g og salicylsyre 20 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer:

Isopropylalkohol, hypromellose, natriumhydroxid, natriumedetat og rensset vand.

Pakningsstørrelser:

Diprosalic® kutanopløsning fås i plastflasker med 100 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366

25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2015.