

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

GAVISCON®

Oral suspension

Natriumalginat, natriumhydrogencarbonat, aluminiumhydroxid og calciumcarbonat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Gaviscon® uden recept. For at opnå de bedste resultater, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Gaviscon®. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Gaviscon® og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gaviscon®.
3. Sådan skal du tage Gaviscon®.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Gaviscon®.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkningen af Gaviscon® og hvad du skal bruge det til

- Gaviscon® virker ved at danne et skumlag oven på det sure maveindhold og derved forhindre tilbageløb af maveindholdet til spiserøret. Gaviscon® optages ikke i kroppen, det virker kun lokalt.
- Du kan tage Gaviscon® til behandling af halsbrand og sure opstød samt spiserørsbrok.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Gaviscon® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gaviscon®

Tag ikke Gaviscon®

- hvis du er overfølsom over for natriumalginat, natriumhydrogencarbonat, aluminiumhydroxid, calciumcarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Gaviscon®

- Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af anden medicin".
- Tal med lægen, inden du tager Gaviscon®, hvis du:
 - har stærkt nedsat nyrefunktion,
 - skal give Gaviscon® til nyfødte og småbørn.

Brug af anden medicin

- Tal med din læge, hvis du tager:
 - medicin mod infektion (fluorquinoloner og tetracykliner),
 - medicin mod svamp (ketoconazol),
 - celledræbende medicin (estramustin),
 - jernpræparater til indtagelse gennem munden,
 - skjoldbruskkirtelhormoner (tyreoideahormoner),
 - medicin for hjertet (digoxin og sotalol),
 - medicin mod forhøjet calciumindhold i blodet (clodronat),
 - medicin til brug efter organ-transplantation (mycophenolat-mofetil),
 - medicin mod epilepsi (gabapentin),
 - medicin mod leddegigt (penicillamin),
 - medicin mod smerter (diflunisal),
 - aluminiumholdige syrenedsættende medicin med kompleksbindende syrer, som f.eks. drikkevarer der indeholder citronsyre.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Gaviscon® sammen med mad og drikke

Du kan tage Gaviscon® sammen med en lille smule vand. Det er bedst at tage Gaviscon® 1/2 time efter måltidet. Du må ikke tage Gaviscon® sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du kan tage Gaviscon® under graviditet.

Amning:

- Du kan tage Gaviscon®, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Gaviscon® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Gaviscon®

Denne medicin indeholder propylparahydroxybenzoat E 216 og methylparahydroxybenzoat E 218, der kan give allergiske reaktioner, som kan optræde efter behandlingen.

3. Sådan skal du tage Gaviscon®

Suspension omrystes umiddelbart inden brug.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 2 år:

10-20 ml tages efter behov 1/2 time efter måltid og umiddelbart før sengetid eller efter lægens anvisning. Suspensionen kan tages med en lille smule vand.

Børn under 1/2 år:

1-2 ml/kg legemsvægt/døgn fordelt på flere doser, om muligt efter måltidet.

Børn 1/2-2 år:

5-10 ml pr. døgn fordelt på flere doser, om muligt efter måltidet.

Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hvis din læge har ordineret Gaviscon® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har taget for meget Gaviscon®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Gaviscon®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering.

Hvis du har glemt at tage Gaviscon®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Gaviscon®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Gaviscon® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt, kløe.
- Vand i kroppen.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Ophobning af aluminium og forgiftning er set hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Sådan opbevarer du Gaviscon®

- Opbevar Gaviscon® utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Gaviscon® ved almindelig temperatur.
- Tag ikke Gaviscon® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Gaviscon®, oral suspension indeholder:

Natriumalginat 50 mg, natriumhydrogencarbonat 17 mg, aluminiumhydroxid 100 mg og calciumcarbonat 15 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Saccharinnatrium E 954, propylparahydroxybenzoat E 216, methylparahydroxybenzoat E 218, kolloid vandfri silica, xanthangummi, citronaroma, vanillearoma, hindbærearoma og rensset vand.

Pakningsstørrelser:

Gaviscon® oral suspension fås i plastflasker med 500 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Gaviscon® er et registreret varemærke, der tilhører Nordic Group B.V.



191170102