

Pentasa® 1 g, suppositorier

Mesalazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Pentasa® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pentasa®
3. Sådan skal du bruge Pentasa®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Pentasa® virker mod kronisk, blødende betændelse i endetarmen (Ulcerativ proctitis).

Lægen kan have givet dig Pentasa® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PENTASA®

Brug ikke Pentasa®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for salicylater, mesalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har en alvorlig lever- eller nyr sygdom.
- hvis du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
- hvis du har tendens til blødning fra hud eller slimhinder udover blødning fra tarmen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Pentasa®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Pentasa®

Tal med din læge:

- hvis du er overfølsom over for sulfasalazin, som findes i lignende præparater. Hvis du pludselig får kramper, mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslet skal du straks holde op med at bruge Pentasa® suppositorier.
- hvis din lever ikke fungerer normalt.
- hvis dine nyrer ikke fungerer normalt.
- hvis du tager medicin mod gigt eller smerter (NSAID).
- hvis du tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin).
- hvis du har dårlig lungefunktion, specielt astma.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du øger risikoen for blodsygdomme, hvis du samtidig med Pentasa® bruger medicin mod immunsygdomme (azathioprin). Tal med din læge.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Pentasa® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Pentasa® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pentasa® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PENTASA®

Brug altid Pentasa® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 suppositorium (1 g) 1-2 gange dagligt.

Børn: Du må kun give Pentasa® til børn efter aftale med lægen. Børn under 2 år må ikke få Pentasa®. Tal med lægen.

Brugsanvisning

Før du anvender Pentasa® suppositorier, bør du vaske dine hænder grundigt.

- Toiletbesøg anbefales før indføring af suppositoriet.
- Suppositoriet tages ud ved at trykke det ud af blisterkortet.
- Anbring en af de vedlagte fingertutter på indførlingsfingeren.
- Indføringen af et suppositorium sker lettest, når man ligger ned eller sidder foroverbøjet.
- Med fingrene føres suppositoriet så langt op i endetarmen som muligt.
- Såfremt suppositoriet er vanskeligt at indføre, kan det eventuelt fugtes med vand eller fugtighedscreme.
- Smid den brugte fingertut ud. Hvis suppositoriet udskydes indenfor de første 10 minutter, kan et nyt indføres.

Hvis du har brugt for mange Pentasa®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere af Pentasa® suppositorier, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Pentasa®

Glemmer du en dosis, så fortsæt med almindelig dosering. De må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Pentasa® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Brystsmerter pga. hjertemuskelbetændelse. Kan i alvorlige tilfælde medføre hjertesvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Almen sløvhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Er set hos unge i puberteten. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Allergiske lungereaktioner (åndenød, hoste, lungebetændelse, vejtrækningsbesvær). Kontakt læge eller skadestue.
- Akut forværring af tyktarmsbetændelse. Kontakt læge.
- Påvirkning af leveren: Forhøjede levertal, gulsot, leverbetændelse, leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
- Unormal nyrefunktion. Herunder langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade, feber, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder, nyresvigt som kan være forbigående. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Diaré, mavesmerter, kvalme, opkastning, luftafgang fra tarmen.
- Nældefeber, udslæt.
- Hovedpine, feber.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Øget følsomhed af huden for lys.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svimmelhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Blegthed og træthed pga. blodmangel. Det kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Overfølsomhedsreaktioner, feber pga. overfølsomhed.
- Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
- Forbigående hårtab.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Muskelsmerter, smerter i leddene.

Pentasa® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Pentasa® ved temperaturer over 25°C. Brug ikke Pentasa® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pentasa® indeholder:

- Aktivt stof: Mesalazin 1 g.
- Øvrige indholdsstoffer: Povidon, macrogol 6000, magnesiumstearat, talcum.

Pakningsstørrelser

28 suppositorier.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.

Fremstiller

FERRING A/S, 2720 Vanløse

Pentasa® er et registreret varemærke, der tilhører Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S.