

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Propecia® 1 mg, filmovertrukne tabletter

finasterid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Propecia® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propecia®
3. Sådan skal du tage Propecia®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Propecia® bruges til behandling af mandligt hårtab (androgen alopeci).

Man mener, at årsagen til almindeligt mandligt hårtab er en kombination af arv og et bestemt hormon, dihydrotestosteron (DHT), der forkorter hårets vækstfase og udtynner håret. Propecia® nedsætter niveauet af DHT i hovedbunden ved at hæmme et enzym (Type II 5-alfa reductase), der omdanner testosteron til DHT.

Mænd med mildt til moderat, men ikke totalt, hårtab kan forvente at have gavn af Propecia®. De fleste mænd, der har været i behandling med Propecia® i 5 år, har opnået nedsat hårtab, og mindst halvdelen af disse mænd har opnået forbedret hårvækst.

Lægen kan have givet dig Propecia® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROPECIA®

Tag ikke Propecia®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er kvinde (da denne medicin er til mænd, se afsnittet Graviditet og amning). I kliniske

undersøgelser er det vist, at Propecia® ikke virker hos kvinder med hårtab.

Vær ekstra forsigtig med at tage Propecia®

- Børn bør ikke tage Propecia®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicinkøbt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, samt kosttilskud.

Brug af Propecia® sammen med mad og drikke

Du kan tage Propecia® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Propecia® er kun til behandling af almindeligt mandligt hårtab.

Du må ikke tage Propecia®, hvis du er gravid, da det kan skade fostret.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Propecia® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information og nogle af de øvrige indholdsstoffer i Propecia®

Propecia® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PROPECIA®

Tag altid Propecia® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

1 tablet dagligt, med eller uden mad.

Propecia® vil ikke virke hurtigere eller bedre, hvis der tages mere end 1 tablet dagligt.

Det er vigtigt, at du tager Propecia®, så længe din læge ordinerer det. Vedvarende behandling anbefales, hvis virkningen skal opretholdes.

Hvis du har taget for meget Propecia®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget for flere Propecia® filmovertrukne tabletter,

end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Propecia®

Hvis du har glemt en tablet, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte tablet over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Propecia®

Det vil som regel tage 3-6 måneder før en fuld effekt opnås. Det er vigtigt, du fortsætter med at tage Propecia® så længe, din læge foreskriver det. Hvis du stopper med at tage Propecia®, vil du sandsynligvis begynde at miste det nye hår, du har opnået, indenfor 9-12 måneder.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Propecia® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du bør straks kontakte lægen, hvis du oplever ændringer i brystvæv såsom knuder, smerter, forstørrelse af bryst eller udlåd fra brystvorte, da disse kan være tegn på alvorlig tilstand såsom brystkræft.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Impotens.
- Ændringer i sædvæske inklusive nedsat sædmængde.
- Nedsat lyst til sex.
- Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Hjertebanken.
- Overfølsomhedsreaktioner inklusive udslæt, nældefeber samt hævelser af læber og ansigt. Hævelse af læber og ansigt kan være alvorligt. Kontakt lægen eller skadestuen.
- Forhøjede levertal.
- Brystømhed og -forstørrelser.
- Testikelsmerter.
- Ufrugtbarhed er blevet set hos mænd, der har taget finasterid over en længere periode og har andre risiko faktorer, der påvirker frugtbarhed. Normalisering eller forbedring af sæd kvaliteten er blevet set efter behandlingen med finasterid er stoppet. Langtidskliniske undersøgelser om

finasterids effekt på frugtbarhed hos mænd er ikke blevet udført.

- Vedvarende rejsningsproblemer efter behandlingen er stoppet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Propecia® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Afllever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Propecia® 1 mg, filmovetrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Finasterid 1 mg.
- Øvrige indholdsstoffer:
Tabletterne: Lactosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, pregelatineret majsstivelse, natriumstivelsesglycollat, natriumdocusat, magnesiumstearat.
Filmoveutræk: Talkum, hypromellose, hydroxypropylcellulose, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).

Pakningsstørrelser

Propecia® findes i pakninger med 7, 28, 30, 84 eller 98 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Propecia® er et registreret varemærke, der tilhører MERCK SHARP & DOHME CORP., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.