

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma 20 mg/g + 10 mg/g, creme

Fusidinsyre/hydrokortisonacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma
3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma creme kombinerer fusidinsyrens (antibiotikum) bakteriedræbende virkning med hydrokortisonacetats (binyrebarkhormon) betændelseshæmmende (antiinflammatoriske) virkning.

Det er en medicin til behandling af hud med inficeret atopisk eksem (hudsygdom, med inflammation (vævsreaktion du får i forbindelse med hudsygdommen), rødme, væske, sår og kløe).

Lægen kan have givet dig Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE FUSIDINSYRE-HYDROKORTISON-ACETAT EUROPHARMA

Brug ikke Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for fusidinsyre, hydrokortisonacetat eller at af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har en hudinfektion, som hovedsagelig er forårsaget af bakterier, svampe eller virus (fx herpes eller varicella).
- hvis du har sår
- hvis du har hudsygdomme med tynd hud
- hvis du har tuberkulose

- hvis du har syfilis
- hvis du har eksem rundt om munden
- hvis du har rosacea (svær rødmen af ansigts huden).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

- Undgå at få Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma creme i øjnene. Du skal påsmøre den med forsigtighed, hvis du skal bruge den nær øjnene.
- Du bør undgå længere tids behandling.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma efter aftale med lægen.

Amning

Du kan bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma, selvom du ammer.

Hvis Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma bruges på brystvorterne, skal al creme på brystvorterne renses af før amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma indeholder butylhydroxyanisol (E320) og cetylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE FUSIDINSYRE-HYDROKORTISONACETAT EUROPHARMA

Brug altid Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn

Påsmør cremen forsigtigt i et tyndt lag på det syge område 3 gange daglig. Du må ikke bruge

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma i mere end 2 uger.

Vask omhyggeligt hænderne efter påsmøring af cremen, medmindre det er dine hænder, der behandles.

Hvis du har brugt for meget Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

Spørg læge eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrerne. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hudirritation, brændende eller stikkende fornemmelse på huden, kløe, forværret eksem.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Allergisk reaktion.
- Udslæt, kontakteksem, hvide pletter på huden.
- Tynd hud, der let går i stykker.
- Tydelige små blodkar i huden og strækmærker (især efter længere tids brug).
- Betændelse i hårsække.
- Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
- Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Allergisk kontakteksem.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Brug ikke Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma 20 mg/g + 10mg/g, creme indeholder

- Aktive stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og hydrokortisonacetat 10 mg/g.
- Øvrige indholdsstoffer: Butylhydroxyanisol (E320), cetylalkohol, glycerol (85%), paraffinolie, kaliumsorbat (E202), polysorbat 60, hvid blød paraffin og rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma er en hvid creme.

Hver pakning indeholder en tube med 5, 15 eller 30 gram creme.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.