

Dixarit® 25 mikrogram, overtrukne tabletter

clonidinhydrochlorid

Dixarit® er parallelimporteret i forhold til Catapresan®.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Dixarit® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dixarit®
3. Sådan skal du tage Dixarit®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dixarit® påvirker blodtrykket og udvider blodkarrene i kroppen. Dixarit® kan bruges til at

- forebygge migræne. Dixarit® kan ikke anvendes ved akutte migræneanfald.
- behandle hedeture i overgangsalderen, når du ikke kan tåle behandling med østrogen.

Lægen kan have givet dig Dixarit® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DIXARIT®

Tag ikke Dixarit®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for clonidin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du lider af alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.
- hvis du ikke tåler visse sukkerarter.

Vær ekstra forsigtig med at tage Dixarit®

Tal med din læge inden du tager Dixarit, hvis du har:

- dårligt hjerte
- forstyrrelser i blodomløbet i kroppen
- depression
- nervebetændelse (polyneuropati)
- forstoppelse
- dårlige nyrer (Dixarit® udskilles fra kroppen igennem nyrerne)

Oplys altid ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Dixarit®, da blodsukkeret kan være forhøjet.

Anvend ikke Dixarit® sammen med methylphenidat.

Spørg lægen eller på apoteket.

Dixarit® kan nedsætte tåredannelsen. Dette kan have betydning, hvis du bruger kontaktlinser.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. betablokkere)
- Sovemedicin
- Beroligende medicin
- Medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
- Medicin mod sindslidelser (spørg din læge)

Vær opmærksom på, at Dixarit® forstærker den sløvende effekt af alkohol og nerve- eller sovemedicin.

Brug af Dixarit® sammen med mad og drikke

Dixarit® kan både tages sammen med mad og alene. Tabletterne tages med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Dixarit®. Tal med lægen.

Amning

Du må ikke tage Dixarit®, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dixarit® kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dixarit®

Dixarit® indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DIXARIT®

Tag altid Dixarit® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 tablet 2 gange dagligt (en morgen og en aften). Ved utilstrækkelig virkning efter 2 ugers behandling kan dosis øges op til 3 tabletter 2 gange daglig. Fuld effekt kan forventes efter 2-4 ugers behandling.

Børn

Dixarit® bør ikke anvendes af børn og unge.

Nedsat nyrefunktion

Har du nedsat nyrefunktion, skal du have en lavere dosis, da Dixarit® udskilles gennem nyrerne. Tal med din læge.

Hvis du har taget for meget Dixarit®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering kan være dødsghed, langsom puls, lavt blodtryk med svimmelhed, sammentrækning af pillen, lav kropstemperatur, forstyrrelser i hjerterytmen og diarré. Du kan opleve vejrtrækningsbesvær, langsomt åndedræt, blive bevidstløs og vejrtrækningen kan stoppe.

Hvis du har glemt at tage Dixarit®

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis som sædvanligt.

Hvis du holder op med at tage Dixarit®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Dixarit®.

Du bør nedtrappe Dixarit® over en periode på 2-4 dage, hvor du gradvist indtager mindre og mindre Dixarit®. Pludselig ophør efter en længerevarende behandling med høje doser Dixarit® kan medføre rastløshed, hjertebanken, rystelser, hurtig blodtryksstigning, nervøsitet, rysten, hovedpine og kvalme.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dixarit® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hvide, "døde" fingre og tæer. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Langsom uregelmæssig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Svimmelhed, sløvhed.
- Mundtørhed.
- Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine.
- Forstoppelse, kvalme, smerter i spytkirtler, opkastning.
- Træthed.
- Impotens.
- Depression, søvnforstyrrelse. Depression kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

- Føleforstyrrelser i arme og ben.
- Kløe, hududslæt, nældefeber.
- Utilpashed.
- Hallucinationer, sanseforstyrrelser, mareridt. Hallucinationer kan blive alvorligt. Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Stigning i blodsukkerniveauet. Kan vise sig ved hyppig vandladning, tørst og træthed. Tal med lægen.
- Nedsat dannelse af tårevæske (OBS: bruger du kontaktlinser, så se under særlige forholdsregler).
- Tørhed i næseslimhinden.
- Nedsatte tarmbevægelser.
- Hårtab.
- Udvikling af bryster hos mænd.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Nedsat evne til at se skarpt.
- Forvirring, nedsat sexlyst.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Dixarit® ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Dixarit® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLSYNINGER

Dixarit® 25 mikrogram, overtrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Clonidinhydrochlorid 25 mikrogram.
- Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat, lactose, majstivelse, kolloid silica, povidon, opløselig stivelse, indigotin (E132), magnesiumstearat, saccharose, talcum, akaciegummi, titandioxid (E171), macrogol 6000, carnauba voks og hvid bivoks.

Pakningsstørrelser

Dixarit® findes i en pakning med 100 overtrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Dixarit® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.