

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mestimon® 60 mg, overtrukne tabletter

Pyridostigminbromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Mestimon® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Översigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestimon®
3. Sådan skal du tage Mestimon®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mestimon® hæmmer nedbrydningen af signalsubstansen acetylcholin, som formidler nerveimpulser til musklerne. Mestimon® hjælper hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til musklerne.

Du kan bruge Mestimon® til behandling af myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed).

Du kan også bruge Mestimon® til behandling af slaphed af blære- og tarmmuskulatur.

Lægen kan have givet dig Mestimon® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MESTIMON®

Tag ikke Mestimon®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for pyridostigminbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har mekanisk tarmslyng.
- hvis du har forstoppelse i urinrøret.
- hvis du har bughindebetændelse.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mestimon®

Behandling med Mestimon® kræver omhyggelig kontrol hvis du lider af følgende sygdomme.

Tal med din læge, hvis du:

- har astma.
- har epilepsi.
- har nedsat nyrefunktion.
- har lavt blodtryk.
- har en hjertesygdom.

- har mekanisk tarmpassagehindring.
- har urinrørs-passagehindring.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin som udvider pupillen (atropin).
- muskelafslappende medicin (suxamethon).
- betablokkere, da langsom puls og lavt blodtryk kan forekomme.
- medicin mod allergi og transportsyge (antihistaminer).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Mestimon® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Mestimon® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mestimon® kan give bivirkninger, f.eks. lavt blodtryk, svimmelhed og tågesyn, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

Mestimon® indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MESTIMON®

Tag altid Mestimon® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Myasthenia gravis:

Voksne: 1-3 tabletter (60-180 mg) 2-4 gange daglig.

Slaphed af blære- og tarmmuskulatur:

Voksne: 1 tablet (60 mg) hver 4. time.

Hvis du har taget for mange Mestimon® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mestimon® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være kraftigspytlåb, næseflåd, øget tåreflåd, rastløshed,

sved, koliksmarter, kvalme, opkastning, diaré, muskeltrækninger og tiltagende muskellammelse. Desuden kan ved meget høje doser forekomme vejrtrækningsbesvær, åndenød, kramper, koma, kolik, svækket vejrtrækning og hjertebesvær.

Hvis du har glemt at tage Mestinin®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Mestinin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtige små muskelsammentrækninger.
- Små pupiller, øget tåreflåd, tågesyn, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Øget slimproduktion i lungerne som kan give vejrtrækningsbesvær. Kan blive alvorligt. Hvis du får vejrtrækningsbesvær, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Koliksmarter, diaré, kvalme, opkastning, sure opstød, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm, øget spyflåd.
- Ufrivillig vandladning.
- Kraftig sveden.
- Muskelsvaghed, muskelkramper.
- Appetitløshed.
- Snue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Svimmelhed.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Rastløshed, søvnløshed.

Mestinin®, 1. udgave

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hududslæt, hårtab ved langtidsbrug.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Nældefeber.

Mestinin® kan være vanedannende.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Mestinin® ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Mestinin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mestinin® 60 mg, overtrukne tabletter indeholder

- Aktivt stof: Pyridostigminbromid 60 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica, pregelatineret stivelse, povidon, majsstivelse, talcum, magnesiumstearat, saccharose, risstivelse, spraytørret akaciegummi, gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), paraffin, tynd paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelse

Mestinin® 60 mg er orange runde filmovertrukne tabletter.

Mestinin® 60 mg få i en pakning med 150 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Mestinin® er et registreret varemærke, der tilhører ICN Dutch Holdings B.V.