

Risperdal® 1 mg/ml oral opløsning

risperidon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Risperdal® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Risperdal®
3. Sådan skal du tage Risperdal®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Risperdal® tilhører den gruppe medicin, der kaldes antipsykotika.

Risperdal® anvendes til behandling af følgende:

- Skizofreni, en tilstand, hvor du ser, hører eller føler ting, som ikke er der i virkeligheden, tror ting, der ikke er sande, eller føler dig overdrevet mistænksom eller forvirret.
- Mani, en tilstand, hvor du føler dig meget urolig, opstemt, oprevet, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i en sygdom, der hedder bipolar lidelse.
- Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos mennesker med Alzheimers demens, der gør skade på sig selv eller andre. Alternative (uden lægemidler) behandlinger bør have været afprøvet forud.
- Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos børn med indlæringsvanskeligheder (mindst 5 år gamle) og unge med adfærdsvanskeligheder.

Lægen kan have givet dig Risperdal® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE RISPERDAL®

Tag ikke Risperdal®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for risperidon eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Risperdal®

- Tal med lægen eller apoteket, før du tager Risperdal®
- hvis du har hjerteproblemer. Det gælder f.eks. uregelmæssig hjerterytme, eller hvis du har tendens til lavt blodtryk eller tager blodtryksmedicin. Risperdal® kan forårsage lavt blodtryk. Dosis skal muligvis justeres.
- hvis du kender til nogle faktorer, som kan gøre dig disponeret for slagtilfælde, f.eks. forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme eller problemer med tilstoppede blodkar i hjernen.
- hvis du har Parkinsons sygdom eller demens
- hvis du har sukkersyge (diabetes)
- hvis du har epilepsi
- hvis du har oplevet at have en langvarig eller smertefuld rejsning. Hvis du oplever dette, mens du tager Risperdal®, skal du straks kontakte lægen
- hvis du har vanskeligt ved at kontrollere legemstemperaturen eller får hedeure
- hvis du har nyreproblemer
- hvis du har leverproblemer
- hvis test har vist, at du har et unormalt højt indhold af hormonet prolaktin i blodet eller, hvis du har en svulst, der muligvis er afhængig af prolaktin
- hvis du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som

dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du oplever

Ufrivillige rytmiske bevægelser af tungen, munden eller ansigtet. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med risperidon. Feber, alvorlig muskelstivhed, svedudbrud eller nedsat bevidsthed (en tilstand kaldet malignt neuroleptikasyndrom). Det kan være nødvendigt med øjeblikkelig medicinsk behandling.

Tal med lægen eller apoteket, før du tager Risperdal®, hvis du ikke er sikker på, om nogle af ovenstående tilfælde er relevante for dig.

Risperdal® kan forårsage vægtøgning.

Ældre med demens

Der er en øget risiko for slagtilfælde hos ældre patienter med demens. Du bør ikke tage risperidon, hvis du har demens, der er forårsaget af et slagtilfælde. Du bør jævnligt se din læge under behandling med risperidon. Søg straks læge, hvis du eller din pårørende bemærker en pludselig ændring i din psykiske tilstand, hvis du føler pludselig svaghed eller følelsesløshed i dit ansigt, arme eller ben, især i den ene side, eller hvis du får sløret tale, også selv om det blot er i en kort periode. Dette kan være tegn på et slagtilfælde.

Børn og unge

Andre årsager til aggressiv opførsel skal være udelukket, inden behandling af adfærdsvanskeligheder påbegyndes. Hvis der opstår træthed under behandling med risperidon, kan en ændring i indtagelsestidspunktet mindske opmærksomhedsproblemer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Det er især vigtigt at tale med lægen eller apoteket, hvis du tager et eller flere af følgende:

- Beroligende medicin, som virker i hjernen, f.eks. for at hjælpe dig med at slappe af (benzodiazepiner), visse smertestillende midler (opioider) eller midler mod allergi (nogle antihistaminer), da risperidon kan øge den sløvende effekt af disse midler.
- Medicin, som kan ændre hjertets elektriske aktivitet, f.eks. malariamidler, medicin mod forstyrrelser af hjerterytmen (f.eks. kinidin), allergimidler (antihistaminer), visse depressionsmidler (antidepressiva) eller andre lægemidler mod psykiske problemer.
- Medicin, som sænker hjerterytmen
- Medicin, som kan medføre lavt indhold af kalium i blodet (f.eks. bestemte vanddrivende midler)
- Medicin mod forhøjet blodtryk. Risperdal® kan forårsage lavt blodtryk.
- Medicin mod Parkinsons sygdom, f.eks. levodopa.
- Vanddrivende midler (diuretika), som anvendes mod hjerteproblemer eller hævelser i kroppen på grund af væskeansamlinger (f.eks. furosemid eller chlorthiazid). Risperdal indgivet alene eller sammen med furosemid kan øge risikoen for slagtilfælde eller død hos ældre med demens.

Følgende lægemidler kan nedsætte virkningen af risperidon

- Rifampicin (et middel til behandling af visse infektioner)
- Carbamazepin, fenytoin (midler mod epilepsi)
- Phenobarbital

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af risperidon.

Følgende medicin kan øge virkningen af risperidon

- Kinidin (bruges til behandling af forskellige typer af hjertesygdomme)
- Midler mod depression, såsom paroxetin, fluoxetin, tricykliske antidepressiva
- Medicin som benævnes beta-blokkere (bruges til behandling af højt blodtryk)
- Phenothiaziner (bruges f.eks. til behandling af psykoser eller til at slappe af)
- Cimetidin, ranitidin (blokerer syreproduktionen i maven)

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af risperidon.

Tal med lægen eller apoteket, før du tager Risperdal®, hvis du ikke er sikker på, om nogle af ovenstående tilfælde er relevante for dig.

Brug af Risperdal® sammen med mad og drikke

Risperdal® kan tages med eller uden mad. Drik ikke alkohol, når du tager Risperdal®.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Risperdal®. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Risperdal® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Behandlingen med Risperdal® kan medføre svimmelhed, træthed og synsproblemer. Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle og heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før du har talt med lægen.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE RISPERDAL®

Tag altid Risperdal® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

- Behandling af skizofreni

Voksne

Den normale startdosis vil typisk være på 2 mg på den første dag og kan forøges til 4 mg på den anden dag. Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis, alt efter, hvordan du reagerer på behandlingen. De fleste opnår god effekt med daglige doser på mellem 4 til 6 mg. Denne samlede daglige dosis kan opdeles i én eller to doser. Lægen vil fortælle dig, hvad der er bedst for dig.

Ældre

Startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt. Det er muligt, at lægen øger din dosis gradvist til 1-2 mg to gange dagligt. Lægen vil fortælle dig, hvad der er bedst for dig.

Børn og unge

Børn under 18 år må ikke behandles med Risperdal® for skizofreni.

- Behandling af mani

Voksne

Startdosis er normalt 2 mg én gang dagligt. Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen. De fleste opnår god effekt af 1 til 6 mg en gang dagligt.

Ældre

Startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt. Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist til 1-2 mg to gange dagligt, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen.

Børn

Børn under 18 år må ikke behandles med Risperdal® for bipolar mani.

- Behandling af vedvarende aggression hos mennesker med Alzheimers demens

Voksne (herunder ældre)

Startdosis er normalt 0,25 mg to gange dagligt. Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist alt efter, hvordan du reagerer på behandlingen. De fleste opnår god effekt med 0,5 mg to gange dagligt. Nogle patienter behøver 1 mg to gange dagligt. Behandlingsvarighed af patienter med Alzheimers demens, bør ikke være længere end 6 uger.

- Behandling af destruktiv adfærd hos børn og unge

Dosis afhænger af barnets vægt.

Til børn, som vejer under 50 kg: Startdosis er normalt 0,25 mg én gang dagligt. Dosis kan herefter justeres gradvist hver anden dag med 0,25 mg pr. dag. Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,25 mg til 0,75 mg én gang dagligt.

Til børn, som vejer 50 kg eller derover: Startdosis er normalt 0,5 mg én gang dagligt. Dosis kan herefter justeres gradvist hver anden dag med 0,50 mg pr. dag. Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,5 mg til 1,5 mg én gang dagligt

Behandlingen af patienter med destruktiv adfærd bør ikke strække sig over mere end 6 uger.

Børn under 5 år må ikke behandles med Risperdal® for destruktiv adfærd.

Patienter med nyre- eller leverproblemer

Alle startdoser og efterfølgende doser af risperidon bør halveres uanset hvilken lidelse, der skal behandles. Øgning af dosis bør foregås langsommere hos disse patienter. Risperdal® bør bruges med forsigtighed til denne patientgruppe.

Sådan skal du tage Risperdal®


Tag altid Risperdal® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget medicin du skal tage og hvor længe. Det afhænger af din tilstand, og er forskelligt fra person til person. Den mængde medicin, du skal tage, er forklaret i underafsnittet "Hvor meget" ovenfor.

Opløsningen leveres med en sprøjte (pipette). Den bruges til at måle den nøjagtige mængde medicin, som du har brug for.

Gør følgende:

1. Fjern det børnesikre låg. Tryk plastiklåget ned, og drej låget mod uret (Fig. 1).
2. Sæt sprøjten i flasken.
3. Mens den nederste ring holdes på plads, trækkes den øverste ring op til det niveau, som svarer til den dosis i ml eller mg, der skal bruges (Fig. 2).
4. Mens der holdes på den nederste ring, tages sprøjten op af flasken (Fig. 3).
5. Tøm sprøjten i en ikke-alkoholisk drik, dog ikke i te, ved at skubbe topringen ned.
6. Sæt låg på flasken.
7. Skyl sprøjten med vand.



Hvis du har taget for meget Risperdal®
Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Risperdal®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som døsighed, træthed, unormale kropsbevægelser, problemer med at stå og gå, svimmelhed på grund af lavt blodtryk, unormalt hjerteslag eller krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Risperdal®
Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over og fortsætte som normalt. Tag aldrig dobbeltdosis. Kontakt lægen, hvis du glemmer at tage to eller flere doser.

Hvis du holder op med at tage Risperdal®

Du bør ikke holde op med at tage Risperdal, medmindre du får besked på det af lægen, da dine symptomer ellers kan vende tilbage. Hvis din læge beslutter at stoppe din behandling med Risperdal®, kan dosis nedsættes gradvist over flere dage.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Risperdal® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hoste, oppøyt og feber pga. lungebetændelse. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Meget langsom puls. Tendens til besvimmelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Bevidsthedssvækkelse, bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue.
- Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
- Forbigående synstab, talebesvær og svaghed på den ene side af kroppen pga. forbigående blodmangel til en del af hjernen. Kontakt læge eller skadestue.
- Vejtrækningsbesvær evt. hoste med blodigt oppøyt pga. øget blodtilførsel til lungerne eller luftevejene. Kontakt læge eller skadestue.
- Lungebetændelse forårsaget af indånding af fødevarer i luftevejene. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
- Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarlig. Ring 112.
- Dyb bevidstløshed (koma) på grund af ukontrolleret diabetes. Ring 112.
- Talebesvær, sløret bevidsthed pga. forstyrrelser i blodforsyning til hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hovedpine, kvalme, synsedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Uregelmæssig vejtrækning med vejtrækningspauser under søvn. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.
- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
- Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge eller skadestue.
- Gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Livstruende komplikationer ved ukontrolleret diabetes. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Indtagelse af sundhedsskadelige mængder vand. Kontakt læge.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimmelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarlig. Ring 112.
- Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk, hovedpine.
- Søvnløshed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Vægtøgning.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Rokkende, vridende bevægelser især med benene, svimmelhed, rysten, ufrivillige bevægelser af kroppen, døsighed, sløvhed, søvnliggende sløvhedstilstand.
- Sløret syn.
- Andenød, næseblod, hoste, forstoppet næse, ondt i halsen. Andenød kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Opkastning, diaré, forstoppelse, kvalme, mavesmerter, sure opstød, mundtørhed, mavegener.
- Ufrivillig vandladning.
- Udslæt, rødmen af huden.
- Smerter i leddene, rygsmerter, smerter i arme og ben.
- Forøget eller nedsat appetit.
- Influenza, luftvejsinfektion, svien og smerter ved vandladning pga. infektion i urinvejene.
- Feber, træthed, hævede fødder, ankler og hænder, kraftsløshed og svaghed, brystmerter.
- Angst, rastløs uro, søvnforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Forhøjede levertal.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Forhøjet kropstemperatur.
- Hjerterbanken, langsom puls. Langsom puls kan blive alvorlig. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Manglende reaktion på stimulation.
- Besvimmelse. Ved normal puls og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Talebesvær, opmærksomhedsforstyrrelser, stort søvnbehov, svimmelhed efter ændring af kroppens stilling, balanceforstyrrelser, langsomme ufrivillige bevægelser, taleforstyrrelser, unormal koordination, nedsat følelse ved berøring.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, øget blodforsyning til øjet, øjenflåd, hævede øjne, øjentørhed, øget tåreflåd, lysfølsomme øjne.
- Ørepine, susen for ørerne (tinnitus).
- Hvæsende vejtrækning, vejtrækningsforstyrrelser, tørre rallelyde fra bronkierne, talebesvær.
- Synkebesvær, ufrivillig afføring, meget hård afføring.
- Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Smerter og svien ved vandladningen, ufrivillig vandladning, hyppig vandladning.
- Udslæt (nædefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.
- Sår på huden, hudsygdomme, kløe, uren hud (bumser), misfarvning af huden, hårtab, skællekslem, tør hud, hornagtige fortykkelser af huden.
- Muskelsvaghed, muskelsmerter, nakkesmerter, hævede led, unormal holdning, ledstivhed, muskel- og skeletmerter i brystet.
- Appetitmangel, voldsom tørst.
- Bihulebetændelse, virusinfektion, øreinfektion, halsbetændelse, infektion i huden, mellemørebetændelse, øjenbetændelse, betændelse i huden forårsaget af mider, luftvejsinfektion, blærebetændelse, neglesvamp.
- Svimmelhed, evt. besvimmelse pga. lavt blodtryk, svimmelhed evt. besvimmelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk, blussen.
- Hævelse af ansigtet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Gangforstyrrelser, utilpashed, træghed, influenzalignende sygdom, tørst, ubehag i brystet, kulderystelser.
- Overfølsomhed.
- Udeblivende menstruation, seksuelle funktionsforstyrrelser, impotens, sædafgangsforstyrrelser, mælkesekretion, udvikling af bryster hos mænd, uregelmæssig menstruation, udfald fra skeden.
- Forvirring, mani, nedsat seksualdrift, ligegyldighed, nervøsitet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Bevægelsesforstyrrelser.
- Nedsat synsstyrke, øjenrulling.
- Kraftig vejtrækning (hyperventilation).
- Hævede læber, betændelse i læberne.
- Skæl.

- Utilstrækkelig produktion af det hormon, som styrer urinudskillelsen.
- Kronisk mellemørebetændelse.
- Hævelser i kroppen.
- Utilpashed pga. stop af behandlingen (seponeringssyndrom), kulde i arme og ben.
- Overfølsomhed over for Risperdal®.
- Manglende evne til at opnå orgasme, følelsesmæssig tilbagevækning.

Risperdal® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Risperdal® Consta

Nedenstående bivirkninger er set ved brug af Risperdal® Consta, et langtidsvirkende middel, som indgives ved injektion. Tal med lægen, hvis du får en eller flere af nedenstående bivirkninger, selv om du ikke bliver behandlet med langtidsvirkende injektioner med Risperdal® Consta:

- Tarminfektion.
- Byld under huden, prikken eller følelsesløshed i huden, eksem.
- Fald i antallet af hvide blodlegemer, som medvirker ved bekæmpelse af bakterieinfektioner.
- Depression.
- Kramper.
- Blinken med øjnene.
- Fømmelse af, at alt kører rundt, eller at du svajer.
- Fald.
- Langsomt hjerteslag, højt blodtryk.
- Tandpine, krampe i tungen.
- Smerter i endeballen.
- Vægttab.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemedelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemedelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Risperdal® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Når flasken er åbnet, skal eventuelle rester smides ud efter 3 måneder.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløb, toilet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Risperdal® 1 mg/ml oral opløsning indeholder:

- Aktivt stof: risperidon 1 mg/ml.
- Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre, benzoesyre, natriumhydroxid, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Den orale opløsning er klar og farveløs.

Risperdal® oral opløsning fås i pakninger med 30 ml eller 100 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Risperdal® er et registreret varemærke, der tilhører Johnson & Johnson.