

Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter

desloratadin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Aerius smeltetabletter til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Øversigt over indlægssedlen:

1. Aerius virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Aerius
3. Sådan skal De bruge Aerius
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Aerius
6. Yderligere oplysninger

1. AERIUS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Aerius er et anti-allergisk lægemiddel, som ikke gør Dem døsigt. Det hjælper med at regulere Deres allergiske reaktion og dens symptomer.

Aerius lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (inflammation af næsepassager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi). Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne.

Aerius anvendes også til at lindre symptomerne i forbindelse med nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende udslett.

Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper Dem med at genoptage Deres normale daglige aktiviteter og søvn.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE AERIUS

Brug ikke Aerius

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for desloratadin, et af de øvrige indholdsstoffer eller over for loratadin.

Aerius er beregnet til voksne og unge (i alderen 12 år og ældre).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Aerius

- hvis De har dårlig nyrefunktion.

Hvis dette gælder for Dem, eller De ikke er sikker, skal De tale med Deres læge før De tager Aerius.

Brug af anden medicin

Der er ingen kendte interaktioner mellem Aerius og andre lægemidler.

Brug af Aerius sammen med mad og drikke

Aerius kan tages til maden eller mellem måltider.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin under graviditet og under amning.

Hvis De er gravid, eller De ammer et spædbarn, anbefales det ikke at anvende Aerius.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosering forventes Aerius ikke at gøre Dem døsigt eller mindre opmærksom. I meget sjældne tilfælde oplever nogle mennesker dog døsighed, som kan have indflydelse på deres evne til at køre eller anvende maskiner.

Vigtige information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Aerius

Aerius-tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE AERIUS

Voksne og unge (12 år gamle og ældre): Tag en tablet en gang dagligt.

Tabletten synkes hel med vand, med eller uden samtidig fødeindtagelse.

Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil Deres læge bestemme hvilken type allergisk snue, De lider af, og vil fastsætte, hvor længe De skal tage Aerius.

Hvis Deres allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil Deres læge anbefale Dem en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af Deres sygdomshistorie.

Hvis Deres allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil Deres læge måske anbefale Dem en længerevarende behandling.

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og De skal derfor følge Deres læges instruktioner.

Hvis De har brugt for meget Aerius-tabletter

Tag udelukkende Aerius således, som det er ordineret til Dem. Ved fejlagtig overdosis forventes ingen alvorlige problemer. Men kontakt Deres læge eller apotek, hvis De tager mere Aerius, end De fik besked på.

Hvis De har glemt at bruge Aerius

Hvis De glemmer at tage Deres medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend så tilbage til Deres sædvanlige medicineringsplan. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Aerius kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hos voksne var bivirkningerne nogenlunde de samme som ved en placebotablet. Træthed, mundtørhed og hovedpine blev imidlertid rapporteret hyppigere end ved en placebotablet. Hovedpine var den mest almindelige rapporterede bivirkning hos unge.

Under markedsføring af Aerius er tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, kløende udslett og hævelse) og udslett blevet rapporteret meget sjældent. Hjerterbanken, hurtigt hjerteslag, mavepine, kvalme, opkastning, mavebesvær, diarré, svimmelhed, døsighed, besvær med at sove, muskelsmerter, hallucinationer, anfald, rastløshed med øget kropsbevægelse, leverbetændelse og unormale leverfunktionsprøver er også rapporteret i meget sjældne tilfælde.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5. SÅDAN OPBEVARER DE AERIUS

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30°C. Opbevares i den originale yderpakning.

Brug ikke Aerius efter den udløbsdato, der står på æsken og blister. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Fortæl Deres apotek det, hvis De bemærker ændringer i tabletternes udseende.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Aerius indeholder

- Aktivt stof: desloratadin 5 mg
- Øvrige indholdsstoffer i tabletten: calciumhydrogenphosphatdihydrat,

mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse og talkum. Tabletovertrækket består af filmovertræk (indeholdende lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid, macrogol 400, indigotin (E132)), klart lag (indeholdende hypromellose, macrogol 400), carnaubavoks og hvid bivoks.

Aerius udseende og pakningsstørrelse

Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter pakkes i enkeltosisblisterpakninger med 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90 eller 100 tabletter. Alle pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgien.

Fremstiller: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgien.

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Aerius, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Rue de Stalle/Stallestraat 73
B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

Luxembourg/Luxemburg

Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles/Brüssel
Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Magyarország

Alkotás u. 53.
H-1123 Budapest
Тел.: +36 1 457-8500

Česká republika

Ke Štvanici 3
CZ-186 00 Praha 8
Тел: +420 221771250

Malta

Associated Drug Co. Ltd
Triq l-Esportaturi
Mriehel
Birkirkara BKR 3000
Тел.: +35622778000

Danmark

Lautrupbjerg 2
DK-2750 Ballerup
Tlf: + 45-44 39 50 00

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV
Тел: +31 (0)800 9999000
(+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

Deutschland

Thomas-Dehler-Straße 27
D-81737 München
Тел: + 49-(0)89 627 31-0
Info@essex-pharma.de

Norge

Pb. 398
N-1326 Lysaker
Tlf: + 47 67 16 64 50

Eesti

A. H. Tammsaare tee 47
EE-11316 Tallinn
Тел: + 372 6139 750

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Тел: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
cora.greece.gragcm@merck.com

Polska

Ul. Taśmowa 7
PL-02-677 Warszawa
Тел.: + 48-(0)22 478 41 50

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Тел: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Portugal

Rua Aqualva dos Açores 16
P-2735-557 Aqualva-Cacém
Тел: +351-21 433 93 00

France

34 avenue Léonard de Vinci
F-92400 Courbevoie
Тél: + 33-(0)1 80 46 40 40

România

Șos. București-Ploiești, nr. 17-21, Băneasa Center, et. 8, sector 1
RO-013682 București
Тел. + 40 21 233 35 30

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited
Тел: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Dunajska 22
SI-1000 Ljubljana
Тел: + 386 01 3001070

Ísland

Hörgatún 2
IS-210 Garðabær
Sími: + 354 535 70 00

Slovenská republika

Strakova 5
SK-811 01 Bratislava
Тел: + 421 (2) 5920 2712

Italia

Via fratelli Cervi snc,
Centro Direzionale Milano Due
Palazzo Borromini
I-20090 Segrate (Milano)
Тел: + 39-02 21018.1

Suomi/Finland

PL 46/PB 46
FIN-02151 Espoo/Esbo
Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.
Τηλ.: 800 00 673
(+357 22866700)
cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Тел: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija

Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013
Тел: + 371-67364224

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited
Тел: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Lietuva

Kęstučio g. 59/27
LT-08124 Vilnius
Тел. + 370 52 101868

Denne indlægseddél blev senest godkendt 06/ 2011

De kan finde yderligere information om Aerius på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside <http://www.ema.europa.eu/>

Paralleldistribueret og ompakket af

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.