

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis, inhalationspulver

Terbutalinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Bricanyl® Turbuhaler® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bricanyl® Turbuhaler®
3. Sådan skal du tage Bricanyl® Turbuhaler®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Bricanyl® Turbuhaler® er en pulverinhalator, der indeholder det virksomme stof terbutalin.

Bricanyl® Turbuhaler® udvider luftvejene, hvilket gør det lettere at trække vejret. Når du trækker vejret gennem Turbuhaler®, følger medicinen med ned i dine lunger.

Du skal bruge Bricanyl® Turbuhaler® til behandling af astmaanfald og andre former for vejtrækningsbesvær. Du skal kun bruge Bricanyl® Turbuhaler®, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl® Turbuhaler® som vedligeholdelsesbehandling.

Lægen kan have givet dig Bricanyl® Turbuhaler® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BRICANYL® TURBUHALER®

Tag ikke Bricanyl Turbuhaler

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for terbutalinsulfat.

Vær ekstra forsigtig med at tage Bricanyl® Turbuhaler®

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af anden medicin".

Tal med lægen, inden du bruger Bricanyl® Turbuhaler®, hvis:

- du har hjerte/karsygdomme. Kontakt lægen hvis du oplever brystsmerte eller andre symptomer på forværring af din hjertesygdom.
- du har for højt blodtryk eller høj uregelmæssig puls, og du er i behandling med digoxin eller anden hjerte medicin, sukker syge eller for højt stofskifte (Basedow).
- medicinen ikke har samme virkning som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller dit forbrug af Bricanyl® Turbuhaler® stiger.

Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.

Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Bricanyl® Turbuhaler®. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Såkaldte beta-blokkere (noget medicin mod for højt blodtryk, hjertesygdomme og nogle øjendråber) kan nedsætte eller blokere for Bricanyl® Turbuhalers® virkning, hvis de indtages samtidigt. Der kan også forekomme ændringer i saltbalancen i blodet (lavt kaliumindhold), når Bricanyl® Turbuhaler® anvendes samtidigt med visse andre typer medicin (xanthin-derivater, steroider og vanddrivende lægemidler). Normalt er dette uden betydning, men i nogle tilfælde kan det påvirke hjerterytmen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Bricanyl® Turbuhaler®, men rådfør dig med din læge. Bricanyl® Turbuhaler® kan hæmme veerne under fødslen.

Amning

Bricanyl® Turbuhaler® går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl® Turbuhaler® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE BRICANYL TURBUHALER

Tag altid Bricanyl® Turbuhaler® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du bør kun bruge Bricanyl® Turbuhaler®, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling.

Børn kan, i starten af behandling med Bricanyl® Turbuhaler®, have brug for hjælp fra en voksen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Sædvanligvis 1 sug (svarende til 0,5 mg) 4 gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan du tage op til 3 sug (svarende til 1,5 mg) ved samme anfald. Du bør dog ikke tage over 12 sug (svarende til 6 mg) i døgnet.

Børn på 10 år og derover:


Sædvanligvis 1 sug (svarende til 0,5 mg) 2 gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan et barn tage op til 2 sug (svarende til 1 mg) ved samme anfald. Et barn på 10 år og derover bør dog ikke tage over 8 sug (svarende til 4 mg) i døgnet.

Brugsvejledning


Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation.



1. Skru den hvide beskyttelseshætte af.
2. Hold din Turbuhaler® lodret med det blå bundstykke nedad.
3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler®. Drej bundstykket én gang frem, så langt du kan, og én gang tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd. Din Turbuhaler® er nu klar til brug. Selv om du drejer bundstykket frem og tilbage flere gange, vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør kun din Turbuhaler®, når du har brug for den.



- Hold din Turbuhaler® væk fra munden. Pust roligt ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Turbuhaler®.
- Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke Bricanyl® Turbuhaler® hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst.



- Tag Turbuhaler® væk fra munden. And derefter langsomt ud. Den mængde medicin, som inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger.
- Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6.
- Skrub beskyttelseshætten på efter brug.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler® i brug

- Turbuhaler® indeholder 50, 100 eller 200 doser (inhalationer). Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er tilbage i din Turbuhaler®.
- Når du for første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens vindue, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny Turbuhaler® i brug.



OBS:

- Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Turbuhaler® er tom.
- Den lyd der kan høres, når du ryster din Turbuhaler®, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin der er tilbage i Turbuhaler®.

Hvis du har taget for meget Bricanyl® Turbuhaler®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Bricanyl® Turbuhaler®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være hovedpine, angst, rysten, kvalme, længerevarende muskelkrampe, ekstra hjerteslag, hurtig puls, uregelmæssig puls og blodtryksfald.

Hvis du har glemt at tage Bricanyl® Turbuhaler®

Bricanyl® Turbuhaler® bør kun anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling.

4. BIVIRKNINGER

Bricanyl® Turbuhaler® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, som opstår, er normalt milde og forsvinder af sig selv efter 1-2 ugers behandling.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Vejtrækningsbesvær/astmalignede anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hurtig, meget uregelmæssig hjerterytme. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Brystsmerte pga. utilstrækkelig iltforsyning i hjertet. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Hovedpine, rysten

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjerrestop). Tal med lægen.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hjertebanken.
- Længerevarende muskelkrampe.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, hyperaktivitet og rastløshed.
- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Ekstra hjerteslag.
- Kvalme.
- Nældefeber, udslæt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares tørt.

Bricanyl® Turbuhaler® skal opbevares med beskyttelseshætten skruet tæt på.

Tag ikke Bricanyl® Turbuhaler® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis, inhalationspulver indeholder:

- Aktivt stof: Terbutalinsulfat 0,5 mg/dosis.

Pakningsstørrelse

Bricanyl® Turbuhaler® fås i pakninger med 50 doser, 100 doser og 200 doser. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Bricanyl® og Turbuhaler® er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.