

Indlægsseddel: Information til brugeren

Verapamil HEXAL 80 mg og 120 mg fillovertrukne tabletter

verapamilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verapamil HEXAL
3. Sådan skal du tage Verapamil HEXAL
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Verapamil HEXAL er et lægemiddel af typen calciumantagonister med virkning på hjerte og kredsløb.

Du kan bruge Verapamil HEXAL til:

- forebyggelse af hjertekrampe (angina pectoris).
- behandling af for højt blodtryk.
- forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerterytme.
- forebyggelse efter blodprop i hjertet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verapamil HEXAL

Tag ikke Verapamil HEXAL:

- hvis du er allergisk over for verapamilhydrochlorid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Verapamil HEXAL (angivet i afsnit 6)
- hvis du er overfølsom overfor andre lægemidler, der ligesom Verapamil HEXAL tilhører gruppen af calciumantagonister

- hvis du lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb
- hvis du lider af hjertesvigt
- hvis du har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock)
- hvis du har for hurtig hjerterytme
- hvis du lider af forstyrrelser i hjerterytmen
- hvis du har meget lavt blodtryk
- hvis du har fået for meget hjertemedicin (digoxin). Kan bl.a. vise sig ved kvalme
- hvis du er i behandling med ivabradin (mod visse hjertelidelser)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Verapamil HEXAL:

- hvis du har meget langsom puls
- hvis du lider af sygdomme i hjerte eller kredsløb
- hvis du lider af forsnævring i aorta
- hvis du har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen
- hvis du lider af sygdomme, hvor der er forstyrrelse i forbindelsen mellem nerverne og musklerne (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom eller fremskreden Duchennes muskeldystrofi)
- hvis du har nedsat leverfunktion
- hvis du har nedsat nyrefunktion

Fortæl altid lægen, at du tager Verapamil HEXAL, hvis du skal bedøves.

Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal kontrolleres både før og under behandling med Verapamil HEXAL.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Verapamil HEXAL.

Brug af andre lægemidler sammen med Verapamil HEXAL

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Tal med lægen, hvis du tager:

- hjertemedicin (digoxin, digitoxin, ivabradin)
- lægemidler, der forebygger dannelse af blodpropper (dabigatran)
- lægemidler mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin)
- andre lægemidler mod for højt blodtryk (betablokkere (metoprolol, propranolol), prazosin, terazosin)
- vanddrivende lægemidler
- lægemidler som udvider blodårerne
- lægemidler efter transplantation (ciclosporin, sirolimus, everolimus, tacrolimus)
- lægemidler mod mani (lithium)
- kolesterolsænkende lægemidler (simvastatin, atorvastatin, lovastatin)
- lægemidler mod astma (theofyllin)
- naturlægemidler mod depression (perikon)
- lægemidler mod infektion (erythromycin, clarithromycin, telithromycin, rifampicin)
- lægemidler mod migræne (clonidin, almotriptan)

- epilepsilægemidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
- lægemidler mod mavesår (cimetidin)
- smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre)
- lægemidler mod angst og uro (buspiron, midazolam)
- muskelafslappende lægemidler
- inhalationsanæstetika (til bedøvelse)
- øjendråber mod grøn stær (timolol)
- lægemidler mod spastiske tilstande (dantrolen)
- lægemidler mod urinsur gigt (colchicin, sulfapyrazon)
- lægemidler til behandling af kræft (doxorubicin)
- lægemidler mod HIV (ritonavir)
- lægemidler mod depression (imipramine)
- lægemidler mod for højt blodsukker (glibenclamid)

Verapamil kan nedsætte metformins blodsukkersænkende virkning.

Brug af Verapamil HEXAL sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Verapamil HEXAL i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.

Du skal være opmærksom på, at Verapamil HEXAL kan øge virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Verapamil HEXAL efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Verapamil HEXAL efter aftale med lægen,

Trafik- og arbejdssikkerhed

Verapamil HEXAL kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Verapamil HEXAL indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du tage Verapamil HEXAL

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

40 mg stigende til 120 mg 3-4 gange daglig. Følg lægens anvisninger.

Forhøjet blodtryk:

Voksne: 120 -240 mg 2 gange daglig. Følg lægens anvisninger.

Forebyggelse efter blodprop i hjertet:

Voksne: 120 mg 3 gange daglig. Følg lægens anvisninger.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Verapamil HEXAL

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Verapamil HEXAL, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være: Døsighed, forvirring, kramper, kvalme, opkastning, feberdøs, forhøjet blodsukker, for lavt blodtryk og alvorlig ændring af hjertets funktion med langsom hjerterytme. Ved mistanke om overdosering kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Verapamil HEXAL

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Verapamil HEXAL

Du bør kun stoppe behandlingen med Verapamil HEXAL efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter

- Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

- Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
- Besvimelse eller bevidstløshed pga. dårlig hjertefunktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
- Forstyrrelser i hjertets funktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

- Depression
- Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter

- Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
- Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112
- Hjertepumpesvigt (kardiogent shock). Ring 112
- Hjertestop. Ring 112
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter

- Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue
- Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

- Kvalme, opkastninger, almen sløvhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
- Svimmelhed
- Sløvhed
- Træthed
- Hovedpine
- Lavt blodtryk
- Hævede ankler
- Forstoppelse
- Sure opstød, halsbrand
- Kvalme
- Kløe
- Eksem
- Nældefeber

- Hårtab
- Impotens
- Uregelmæssig menstruation
- Brystspændinger
- Varmefølelse
- Ansigtsrødme med varmfølelse

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

- Søvnforstyrrelser og livlige drømme
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

- Overfølsomhed
- Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens
- Appetitmangel/madlede
- Forvirring
- Mareridt
- Øresusen (tinnitus)
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
- Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter
- Synsforstyrrelser
- Rysten
- Brystsmerter
- Smerter i benene ved gang (Claudicatio intermittens)
- Mundtørhed
- Diaré
- Mavesmerter
- Opkastning
- Ubehag i maven
- Muskelkramper
- Hyppig vandladning
- Hjertebanken
- Svimmelhed på grund af ubalance i det indre øre

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter

- Forstørrelse af brystkirtlerne hos mænd
- Udslæt i ansigt, på arme og ben samt feber
- Øget svedtendens
- Overvækst af tandkød
- Muskelsmerter
- Ledsmerter
- Blå mærker

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter

- Øget lysfølsomhed i huden (evt. beskadigelse af huden)
- Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
- Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen
- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112. Kan være alvorligt
- Mindre blødning i hud og slimhinder

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

- Pletformet udslæt
- Muskelsvaghed
- Mælkesekretion
- Hævelser i fx ben
- Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser
- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
- Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
- Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. Ring evt. 112

Verapamil HEXAL kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver fx blod- og urinprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blister: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.
Tabletbeholder: Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Verapamil HEXAL 80 mg og 120 mg tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Verapamilhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer:
 - Tabletkernen 80 og 120 mg: Lactosemonohydrat; majsstivelse; povidon; mikrokrySTALLINSK cellulose; natriumstivelsesglycolat; kolloid, vandfri silica; magnesiumstearat.
 - Tabletovertræk 80 mg: Hydroxypropylcellulose; titandioxid (E171); hypromellose; macrogol 6000.
 - Tabletovertræk 120 mg: Lactosemonohydrat; titandioxid (E171); hypromellose; macrogol 4000.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Verapamil HEXAL 80 mg er hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. De har delekærv på den ene side.

Verapamil HEXAL 120 mg er hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. De har delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakning (PP/aluminium) eller tabletbeholder (HDPE-beholder med LDPE låg) indeholdende: 30, 100 eller 250 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret

April 2023