

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

FUCIDINE®

Creme 2 % (ChemVet Pharma ApS)

Chem Vet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg

Tlf.: + 45 86817522

Fucidine 2% creme er parallelimporteret i forhold til Fucidin® 2% creme

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen.
Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.

Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Lægen har ordineret Fucidine® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Fucidine®.
3. Sådan skal du bruge Fucidine®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

Fucidine® indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden.

Medicinen anvendes til

Du kan bruge Fucidine® mod betændelse, der skyldes bakterier, som

Fucidine® virker på.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidine®

Brug ikke Fucidine® hvis

Du er overfølsom over for fusidinsyre eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidine®

Brug af anden medicin

Du kan bruge Fucidine® sammen med anden medicin.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun bruge Fucidine® efter lægens anvisning.

Amning:

Du kan amme, selv om du bruger Fucidine®. Du bør dog ikke smøre det på brystvorterne før amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidine® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucidine®

Denne medicin indeholder butylhydroxyanisol E320, cetylalkohol og kaliumsorbat E202, der kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem).

Butylhydroxyanisol E320 kan desuden give irritation af øjne og slimhinder.

3. Sådan skal du bruge Fucidine®

Den sædvanlige dosering er:

Voksne og børn:

Smør et tyndt lag Fucidine® på huden to til tre gange dagligt.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for meget Fucidine®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucidine® (Chem Vet), end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidine®

Har du glemt at bruge Fucidine®

Glemmer du at bruge en dosis, fortsættes med almindelig dosering.

Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fucidine®

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Fucidine®.

4. Bivirkninger

Fucidine® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt:

Hævelse af hud og slimhinder i ansigt, i munden og i svælget.

Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger :

Udslæt, irritation af huden, kløe, brændende eller stikkende fornemmelse på huden, rødmen af huden, tør hud.

Hyppighed ikke kendt:

Eksem, nældefeber, rødme af ansigt med hævelse omkring øjnene.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

- Opbevar Fucidine® utilgængeligt for børn.
- Anvend ikke Fucidine® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

Du kan opbevare Fucidine® ved almindelig temperatur.

6. Yderligere oplysninger

Fucidine® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Fucidine® er:

Fusidinsyre 20 mg/g.

De øvrige indholdsstoffer er:

Butylhydroxyanisol (E 320), cetylalkohol, glycerol, kalium sorbat (E 202), paraffinolie, polysorbat 60, hvid vaselin og rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelser.

Udseende

Fucidine® er en hvid creme uden særlig lugt.

Pakningsstørrelser

Angivelse af pakningsstørrelse:

Fucidine® creme findes i 15 g og 30 g.

Det er ikke sikkert at begge pakningsstørrelser markedsføres.

Indehaver af Markedsføringstilladelsen i Danmark

Chem Vet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg

Mail: info@Chemvet.dk

Ompakket og frigivet af:

HB-Medical ApS, Kanalholmen 25-29, 2650 Hvidovre, eller

Grundtvig A/S, Skovshovedvej 6, 2920 Charlottenlund.

Aflever eventuelle medicinrester og tømt pakningsmateriale på apoteket.

Denne indlægsseddel er sidst revideret

11.2010

Fucidine® er et registreret varemærke, der tilhører LEO PHARMA A/S