

Confortid

25 mg kapsler, hårde

Indometacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
- Lægen har ordineret Confortid til dig personligt. Lad derfor være med at give Confortid til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Confortid og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Confortid
3. Sådan skal du tage Confortid
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Confortid
6. Yderligere information.

1. Virkningen af Confortid og hvad du skal bruge det til

Confortid virker smertestillende, betændelseshæmmende og febersænkende.

Confortid anvendes til behandling af gigttildelser og andre sygdomme, som præges af smerter i muskler, sener, led og knogler. Benyttes også mod stærke menstruationssmerter.

Lægen kan have givet dig confortid for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Confortid

=

Tag ikke Confortid hvis:

- du er overfølsom (allergisk) over for indometacin eller et af de øvrige indholdsstoffer
- du tidligere har haft blødning fra mave-tarmkanalen eller hul i mave-tarmvæggen i forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)
- du har aktivt eller tilbagevendende mavesår eller blødning fra mave-tarmkanalen
- du har astma, nældefeber eller snue udløst af allergi overfor acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)
- dit blod har meget svært ved at størkne
- du har alvorlig nedsat hjertefunktion
- du har alvorlig nedsat leverfunktion
- du har alvorlig nedsat nyrefunktion
- du har forhøjet blodtryk
- du har nedsat antal blodplader
- du er gravid i 7-9 måned.

Vær ekstra forsigtig med at tage Confortid, hvis

- du er ældre
- du lider af psykiske forstyrrelser, epilepsi eller parkinsonisme, da indometacin i nogen tilfælde kan forværre disse lidelser.
- du tidligere har haft mavesår eller har øget risiko for mavesår
- du har eller tidligere har haft en mave-tarmlidelse (især blødende tyktarmsbetændelse eller Crohn's sygdom)
- du samtidig bruger medicin med binyrebarkhormon (fx kortison og prednison), blodfortyndende medicin (warfarin og acetylsalicylsyre) eller medicin mod depression (SSRI)
- du har nedsat hjertefunktion
- du har forhøjet blodtryk
- dit blod har svært ved at størkne
- du har nedsat nyrefunktion
- du ønsker at blive gravid

Confortid kan som andre NSAID maskere symptomer på infektion

Tal med lægen, hvis

- du får mavesmerter eller blødning fra mave-tarmkanalen, mens du er i behandling med Confortid
- du får udslæt
- du får sløret syn
- du under behandling med Confortid oftere får hovedpine eller din hovedpine bliver værre. Længerevarende brug af smertestillende medicin kan give disse symptomer og i de tilfælde skal behandlingen afbrydes.
- du tager visse typer medicin (se under afsnittet " Brug af anden medicin")

Vær opmærksom på følgende

- Oplys altid ved blodprøvekontrol eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Confortid. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, hvis du tager medicin mod:

- immun- og betændelsesreaktioner (binyrebarkhormon)
- for højt blodtryk, blodpropper og problemer med hjertet (vanddrivende- og blodtrykssænkende medicin, betablokkere, ACE-hæmmere, digoxin og blodfortyndende medicin inklusive warfarin og heparin)
- gigt, kræft og psoriasis (methotrexat)
- smerter og hævelse (acetylsalicylsyre, ibuprofen, diflunisal)
- sygdomme, der kræver undertrykkelse af immunforsvaret, f.eks. ved transplantationer (ciclosporin og tacrolimus)
- depression og forskellige angsttilstande (lithium og SSRI)
- urinsur gigt (probenecid)
- infektioner (amikacin og gentamicin)

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Confortid de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen. Du må kun tage Confortid i de første 6 måneder af graviditeten efter lægens anvisning.

Hvis du ønsker at blive gravid skal du være opmærksom på, at behandling med Confortid kan nedsætte din evne til at blive gravid. Derfor bør din behandling være så kortvarig som mulig og i lavest mulig dosis. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Confortid, da Confortid går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Confortid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Confortid

Confortid 25 mg kapsler indeholder 163 mg lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Confortid

Tag altid Confortid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1-2 kapsler 2-3 gange dagligt. Døgndosis bør ikke overskride 150-200 mg.

Børn: 2 mg pr. kilo pr. døgn fordelt på 3 doser.

Hofteoperation

Voksne: 1 kapsel 3 gange dagligt i 4-6 uger efter operation

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Confortid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Confortid end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering:

- Kvalme og opkastning
- Usikre og famlende bevægelser stigende til bevidstløshed og kramper
- Påvirkning af lever- og nyrefunktion
- Forstyrrelser i blodets evne til at størkne

=

Hvis du har glemt at tage Confortid

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en kapsel. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Confortid

Ændring eller stop i behandling bør kun ske i samråd med lægen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Confortid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede)

Depression

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):

- Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, brystmerter, forstyrrelser i hjerterytmen, hjertebanken, hoste, hurtig puls, hævede ben. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Øget tendens til blodstørkning i karrene
- Sårdannelse i spiserøret, mave, tolvfingertarm, tyndtarm eller tyktarm med hul og blødning, sårdannelse i tarmen efterfulgt af forsnævring og tilstopning, blødning fra mave-tarmdannelse uden tydelig sårdannelse, perforation af tidligere læsioner i nederste del af tyktarmen, cancer.
- Nedsat nyrefunktion herunder nyresvigt
- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), fx hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock, choklignende tilstand) Ring 112 (kan være livsfarligt).
- Gulsot. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede)

- Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt 112.
- Svær blodmangel med træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden. Kontakt læge.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
- Dyb bevidstløshed (koma), søvnliggende bevidsthedssvækkelse, kramper. Ring 112.
- Betændelse i tyndtarmen fx ulcerøs kolit
- Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen. Kontakt straks læge eller skadestue
- Kraftig afskalning og afstødning af hud, blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre at luftvejene blokeres. Ring 112.
- Leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

- Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Psykoser/sindlidelser. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos end 1-10 ud af 100 behandlede)

- Hovedpine, svimmelhed, træthed, døsighed
- Susen for ørerne (tinnitus)
- Kvalme, opkastning, diaré, mavebesvær, mavesmerter, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):

- Hjertebanken, bryst smerter
- Blodmangel pga. mavesår.
- Besvimelsesanfald, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden., nervebetændelse med smerter og føleforstyrrelser. forøget svedtendens, hedeudslæt
- Hørenedsættelse
- Næseblod, astma
- Luft i maven
- Spiseforstyrrelser
- Nedsat urinmængde, blod i urinen, blod i afføringen, blodigt opkast
- Kløe, nældefeber og andre former for hududslæt, rødmen, punktformede blødninger i huden, hårtab
- Snue
- Vand i kroppen, forhøjet blodtryk, lavt blodtryk

Der kan i sjældne og i meget sjældne tilfælde være andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker oplysninger om disse bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger kan hermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer du Confortid

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Confortid kapsler efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere information

Confortid 25 mg kapsler indeholder

Aktivt stof: Indometacin 25 mg

Øvrige indholdsstoffer: Lecithin, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat og lactosemonohydrat henholdsvis (163 mg) eller (255 mg).

Kapslen: Gelatine og titandioxid (E 171).

Udseende af Confortid og pakningsstørrelser

Udseende:

Confortid 25 mg kapslen er hvid og mærket Confo 25 mg.

Pakningsstørrelser:

Confortid kapsler 25 mg: plastbeholder med 30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Actavis Group hf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island.

Fremstiller

Actavis Norway AS, Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen, Norge

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Revideret i juli 2008