

Desmopressin Singad

10 mikrogram/dosis næsespray, opløsning

Desmopressin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Desmopressin Singad til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at bruge Desmopressin Singad.
- Sådan skal du bruge Desmopressin Singad.
- Bivirkninger.
- Opbevaring.
- Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Desmopressin Singad næsespray er en opløsning, der bruges i næsen. Desmopressin Singad virker ved at nedsætte produktionen af urin.

Du kan bruge Desmopressin Singad:

- Mod meget stor dannelse af urin (diabetes insipidus).
- Til undersøgelse af nyrernes funktion.

Lægen kan have givet dig Desmopressin Singad for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Hvis du tidligere er blevet by-pass opereret, lider af cystisk fibrose eller er meget ung eller ældre, kan det også være nødvendigt med nedsat dosis.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- Depression (tricykliske antidepressiva, SSRI-præparater).
- Psykosser (chlorpromazin).
- Epilepsi (carbamazepin)
- Smertestillende medicin af NSAID-typen
- Brystspænding (oxytocin)
- Forhøjet kolesterol (clofibrat).
- Gigt (indomethacin)
- Sukkersyge (glibenclamid)
- Mani (lithium)

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Desmopressin Singad efter aftale med lægen.

Amning

Du kan tage Desmopressin Singad, selvom du ammer.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Desmopressin Singad

Brug ikke Desmopressin Singad

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for desmopressin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du af vane eller psykisk betinget har trang til at drikke meget.
- Hvis du er i behandling med vanddrivende medicin f.eks. pga. dårligt hjerte eller andre tilstande.
- Hvis du har moderat eller alvorligt nedsat nyrefunktion.
- Hvis du har for lavt natriumindhold i blodet.
- Hvis du lider af tilstanden SIADH, som er en tilstand med meget høj produktion af antidiuretisk hormon (ADH).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Desmopressin Singad

Alle patienter, der behandles med Desmopressin Singad, skal undgå overdrevet indtag af væske, da det kan føre til ophobning af vand i kroppen.

Hvis der er tegn på væskeophobning i kroppen, skal behandlingen afbrydes og lægen kontaktes. Symptomerne på for meget væske i kroppen er hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper.

Når Desmopressin Singad næsespray anvendes til undersøgelse af nyrernes evne til at koncentrere urin, skal du drikke mindst muligt (maksimalt 0,5 liter) i perioden fra 1 timer før til 8 timer efter, at du har taget medicinen.

Tal med lægen, inden du tager Desmopressin Singad, hvis

- Du lider af en hjertesygdom eller sygdomme i hjertets kranspulsårer.
- Du lider af forhøjet blodtryk, kronisk nyresvigt eller øget tryk inde i hovedet.
- Du lider af forstyrret væske- og/eller elektrolytbalance.

Dosis skal måske tilpasses særligt til dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desmopressin Singad påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Desmopressin Singad

Brug altid Desmopressin Singad nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Ikke alle doseringer kan opnås med Desmopressin Singad næsespray 10 mikrogram/dosis.

Diabetes insipidus:

Voksne: 1-2 pust (10-20 mikrogram) 1-2 gange daglig

Børn: 5-10 mikrogram 1-2 gange daglig

Undersøgelse af nyrernes koncentrations-evne:

Voksne: 4 pust (40 mikrogram)

Børn over 1 år: 2 pust (20 mikrogram).

Børn under 1 år: 1 pust (10 mikrogram).


Sådan bruger du Desmopressin Singad næsespray

Første gang du bruger Desmopressin Singad næsespray, skal pumpen fyldes. Det gør du ved at trykke pumpen ned ca. fire gange eller indtil der kommer en ensartet sky af gangske små dråber. Det samme skal du gøre, hvis næsesprayen ikke har været brugt i en uge.

Vigtigt!

For at opnå en ensartet dosering, er det vigtigt at plastslangen i flasken er dækket af væske, som vist på illustration 2. Ved doser svarende til mere end 1 pust i hvert næsebor, holdes en pause på ca. 1 minut inden næste pust i samme næsebor.

BLACK	This Artwork is Property of		Product:			Country:	
	GRAPHIC SOLUTIONS		Die Cut			DENMARK	
	FILM TAMPERING UNLEAVED		Measurement			Bar-Code:	
	Product Code:		148 x 432 mm			Font Size/Leading	
	Draft N°:		g/mq			/	
Execution Date:		Materials:		Tickness:		Draft N°	Execution Date
25.03.2011		PO Number:		Date:			
		Date		Artworks Status:			
		Signature					
The proof colour could be different by true Pantone® reference		Film Quality Control					



Brugsvejledning:

- 1. Puds næsen, og fjern beskyttelseshætten (ill. 1).
 - 2. Hold næsesprayen som vist på ill. 3.
 - 3. Læn hovedet en smule tilbage. Før spidsen op i næseboret. Træk vejret svagt ind under pustet.
 - 4. Hvis du får ordineret mere end 1 pust, sprayer også i det andet næsebor. For hvert pust skiftes næsebor.
- Hvis det er nødvendigt at bruge mere end ét pust per næsebor, indlægges en pause på ca. 1 minut mellem hvert pust i samme næsebor.
- 5. Sæt beskyttelseshætten på efter brug. Opbevar sprayflasken stående.

Hvis du har brugt for meget Desmopressin Singad næsespray
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er væskeophobninger i kroppen, hovedpine, kvalme/opkastning, vægtstigning og i alvorlige tilfælde kramper og bevidstløshed.

Hvis du har glemt at bruge Desmopressin Singad næsespray
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger
Desmopressin Singad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Allergiske reaktioner som kløe, udslæt, feber og krampelignende sammentrækninger i bronkierne, overfølsomhed. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Træthed, svimmelhed.
- Tilstoppet næse, snue, næseblod.
- Mavesmerter, kvalme.
- Hovedpine.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Væskeansamling i hjernen. Kontakt lægen.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Vrangforestilling, ophidselse, forbigående adfærdsændringer.
- Hjertebanken.
- Rødmen.

Hvis ikke væskeindtaget begrænses som angivet under punktet ” Vær ekstra forsigtig med at tage Desmopressin Singad”, kan unormalt meget væske opsamles i kroppen og føre til hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

- 5. Opbevaring**
- Opbevar Desmopressin Singad utilgængeligt for børn.
 - Ikke anbrudt: Opbevar Desmopressin Singad næsespray i køleskab (2-8 °C). Anbrudt: Opbevar ikke Desmopressin Singad næsespray ved temperaturer over 25 °C.
 - Brug Desmopressin Singad næsespray inden 30 dage efter åbning.
 - Tag ikke Desmopressin Singad efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 - Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger
Desmopressin Singad 10 mikrogram/dosis næsespray indeholder:
Aktivt stof: Desmopressinacetat
Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, citronsyremonohydrat, dinatriumphosphatdihydrat og rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:
Udseende
Desmopressin Singad næsespray er en klar farveløs opløsning.

Pakningsstørrelse
Desmopressin Singad næsespray findes i pakningsstørrelsen 6 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:
SinGad Pharma ApS
Vibe Allé 5, blok 2B
2980 Kokkedal

Fremstiller
Alfawasserman S.p.A.
Via Enrico Fermi, 1
65020 Alanno (PE)
Italien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret
Marts 2011

01193628

BLACK	This Artwork is Property of		Product:			Country:	
	GRAPHIC SOLUTIONS		Die Cut			DENMARK	
	FILM TAMPERING UNLEAVED		Measurement			Bar-Code:	
	Product Code:		148 x 432 mm			Font Size/Leading	
	Draft N°:		g/mq			/	
Execution Date:		Materials:		Tickness:		Draft N°	
25.03.2011		PO Number:		Date:		Execution Date	
The proof colour could be different by true Pantone® reference		Film Quality Control		Artworks Status:			
		Date		Signature			