

# INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

## BETASERC® 16 mg tabletter Betahistindihydrochlorid

70116-01-02

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Betaserc® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

### Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Betaserc®.
3. Sådan skal du tage Betaserc®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

## 1. Virkning og anvendelse

- Betaserc® er et middel til behandling af menières sygdom og svimmelhed, der skyldes sygdomme i det indre øre.
- Du kan tage Betaserc® til behandling af anfald med ildebefindende, opkastninger, svimmelhed, susen for ørerne og nedsættelse af hørelsen ved skade i det indre øre (menières sygdom).
- Du kan tage Betaserc® til behandling af svimmelhed som følge af sygdom i det indre øre (vestibulær vertigo).

Lægen kan have givet dig Betaserc® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

## 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Betaserc®

### Tag ikke Betaserc®

- hvis du er overfølsom over for betahistindihydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har en svulst i binyremarven (fæokrocytom).
- hvis du har astma.

### Vær ekstra forsigtig med at tage Betaserc®

- hvis du har eller har haft mavesår.

### Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- depression (MAO-hæmmere).
- allergi og høfeber (antihistaminer).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

### Brug af Betaserc® sammen med mad og drikke

- Det er bedst at tage Betaserc® i forbindelse med et måltid.

### Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

#### Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun tage Betaserc® efter aftale med lægen.

#### Amning:

- Hvis du ammer, må du kun tage Betaserc® efter aftale med lægen.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

Betaserc® påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

## 3. Sådan skal du tage Betaserc®

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

### Den sædvanlige dosis er

#### Voksne:

½ -1 tablet (8-16 mg) 3 gange dagligt. Følg lægens anvisning.

#### Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

#### Børn:

Børn under 18 år bør ikke bruge Betaserc®. Følg lægens anvisninger.

#### Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Betaserc® tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine lægemiddelform til alle de anførte doseringer.

Tag altid Betaserc® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

### Hvis du har taget for mange Betaserc®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Betaserc®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

#### Symptomer:

Kvalme, sløvhed og mavesmerter. Evt. krampe, lunge- eller hjerte-komplikationer.

### Hvis du har glemt at tage Betaserc®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

### Hvis du holder op med at tage Betaserc®

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

## 4. Bivirkninger

Betaserc® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### Alvorlige bivirkninger

#### Hyppigheden er ikke kendt:

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

### Ikke alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Kvalme og sure opstød/halsbrand.
- Hovedpine.

#### Hyppigheden er ikke kendt:

- Overfølsomhedsreaktioner i huden, kløe.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, løber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Opkastning, mavesmerter og oppustethed. Symptomerne forsvinder normalt ved nedsættelse af dosis.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

## 5. Opbevaring

- Opbevar Betaserc® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Betaserc® ved temperaturer over 25 °C.
- Opbevar Betaserc® i original beholder, for at beskytte mod lys.
- Tag ikke Betaserc® efter den udløbsdato, der står på pakningen.  
Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## 6. Yderligere oplysninger

Betaserc® 16 mg tabletter indeholder:

Betahistindihydrochlorid 16 mg.

**Øvrige indholdsstoffer:**

Mikrokrystallinsk cellulose, mannitol (E 421), citronsyremonohydrat, vandfri kolloid silica, talkum.

**Pakningsstørrelser:**

Betaserc® fås i:

Betaserc® 16 mg i pakninger med 80 tabletter.

**Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: [info@orifarm.com](mailto:info@orifarm.com)

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.



701160102

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  
Tlf.: +45 6395 2700